

この説明書は、使用前によくお読みください。
なお、使用が終わるまで大切に保管してください。

鼻炎用点鼻薬

第2類医薬品

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎などの鼻づまり・鼻みずに

コフチール鼻炎スプレー

コフチール鼻炎スプレーは、ナファゾリン塩酸塩等の有効成分が患部に直接噴霧されますのですぐに効果が期待できる製剤です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- 3日間位使用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

【用法・用量】

成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。

なお、適用間隔は3時間以上おいてください。


7歳未満の小児は使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起すことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。

〈容器の使用方法〉

- ◆最初に、ご使用になるときは、薬液が霧状になるまで、数度空押しをしてください。
- ◆噴霧するときは、必ず容器を上向きにして使用してください。横向きにして噴霧すると、霧状にならなかったり、液だれすることがあります。



青いキャップをはずしてください。

まっすぐに上向きに持ちノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、1～2度薬液を噴霧してください。

使用後は、ノズル部分を清潔な布やティッシュペーパー等でふき取り、キャップをして、保管してください。

【成分・分量と作用】

100mL中

成分	分量	作用
<u>ナファゾリン塩酸塩</u>	50mg	鼻粘膜のうっ血を改善し鼻づまりをやわらげます。
<u>クロルフェニラミンマレイン酸塩</u>	500mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
<u>ベンゼトニウム塩化物</u>	20mg	鼻粘膜の細菌の増殖をおさえます。
リドカイン	500mg	鼻炎による痛みやかゆみをやわらげます。

添加物として、希塩酸、ハッカ水、水酸化Na、塩化Naを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本剤をご使用になられて、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡頂きますようお願い致します。

福地製薬株式会社

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824