

開封口


【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭痛（頭が重い）

【用法・用量】

成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回1～2度ずつ、1日1～5回鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

使用方法



*容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。
*ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

*容器をかたむけずお使いいただいても、ごくわずかに液が残る場合があります。液が少量になれば、チューブ先端が液に浸るようになると、最後まで使用できません。

《用法・用量に関連する注意》

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 点鼻用のみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】

成分	分量(100mL中)	作用
ナファゾリン塩酸塩	50mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血を抑えて、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン塩	300mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過剰をなくします。
リドカイン	100mg	局所麻酔作用により痛みや不快感を取り除きます。

添加物：パラベン、エタノール、pH調節剤、グリセリン

第2類医薬品

販売名：雪の元点鼻スプレー

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、開封後は期限内であっても品質保持の点からなるべく早く使用してください。

株式会社 雪の元本店 お客様相談室

電話 0744-22-2440
受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00
(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931



販売元
日新薬品工業株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
製造販売元
株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

アレルギー性鼻炎
急性鼻炎などの

**鼻水
鼻づまり**

ナファゾリン塩酸塩配合

第2類医薬品

点鼻薬

アレルギー性鼻炎
急性鼻炎などの

**鼻水
鼻づまり**

セルフメディケーション
税 控除 対象

ナファゾリン塩酸塩
配合



ご使用に際して、この箱の説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は使用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 長期連用しないでください

■【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラジー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

2309-AHI
CM

製造番号 使用期限

