

鼻炎 スプレー

DK
DAIKOKU
定量噴霧タイプ

第2類医薬品 **ダイスツト** 30mL

鼻炎 スプレー

DK
DAIKOKU
定量噴霧タイプ

抗ヒスタミン成分配合

ダイスツト



くしゃみ、鼻水、鼻づまり
鼻炎 定量噴霧タイプ

急性鼻炎やアレルギー性鼻炎
などによる諸症状の緩和に

第2類医薬品 **ダイスツト** 30mL

第2類医薬品

販売名:ダイスツト
内容量:30mL

【保管及び取扱い上の注意】

- 1.高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- 2.小児の手の届かない所に保管してください。
- 3.他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4.他の人と共用しないでください。
- 5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせはお買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

株式会社 雪の元本店
お客様相談室
TEL:0744-22-2440
受付時間 9:00~12:00
13:00~17:00
(十、日、祝日を除く)

副作用報告救済制度 電話 0120-119-931

製造販売元
株式会社 雪の元本店

奈良県橿原市大谷町182番地

紙ラベル キャップノズルボトル



ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

長期連用しないでください

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4)次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
- 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

- 3.3日間位使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

開封口


【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和・鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

【用法・用量】

成人(15歳以上)及び7歳以上の小児:1回1~2度ずつ、1日1~5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

使用方法



- 容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。
- 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等で拭き取り、キャップをしてください。
- ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

《用法・用量に関連する注意》

- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)点鼻用のみ使用し、内服しないでください。

【成分・分量】

成分	分量(100mL中)	作用
ナファリン塩酸塩	50mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえて、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過多をなくします。
ベンザトニウム塩化物	20mg	鼻粘膜を殺菌・消毒します。

添加物:グリセリン、Tタノール、pH調節剤、香料

製造番号 使用期限

2101-AHI