

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎などの

鼻づまり・鼻水に

〈定量噴霧タイプ〉

30mL

〈定量噴霧タイプ〉

アレルギー性鼻炎などの

鼻づまり・鼻水

レチナート®NL 30mL

点鼻薬

抗ヒスタミン成分配合



税 控除 対象

第2類医薬品

第2類医薬品

販売名:レチナートNL点鼻薬  
内容量:30mL

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要なきに読めるよう大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 長期連用しないでください

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー一症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

用法・用量

成人(15歳以上)及び7歳以上の小児：1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

使用方法

1. キャップをとり、容器をもち、液が噴霧するまで、はね部を2～3回押ししてください。
2. 静かに息を吸い込みながら、鼻腔内に噴霧してください。

液が残っている音はするが出ない時、液を吸い上げるチューブは下図のような構造になっています。緩やかなカーブがついているので容器をかたむけずお使い頂くと、むだなくお使いいただけます。

- 容器を横にして使用すると、薬液が露状になりませんので、必ず上向きに使用してください。
- 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等で拭き取り、キャップをしてください。
- ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

成分・分量

(100mL中)

開封口

成分	分量	働き
ナゾソリン塩酸塩	50mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえて、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過多をなくします。
ベンゼトニウム塩化物	20mg	鼻粘膜を殺菌・消毒します。

添加物：グリセリン、エタノール、pH調節剤、香料

《用法・用量に関連する注意》

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 過剰に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用におのみ使用し、内服しないでください。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になつたり品質が変わります。)
4. 他人と共用しないでください。
5. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めの店、又は下記をお願いします。

富山めぐみ製薬株式会社  
お客様相談窓口  
TEL:076(421)5531  
受付時間 9:00～17:00  
(土、日、祝日を除く)



4 987360 200881

発売元  
富山めぐみ製薬株式会社  
富山県富山市三番町3-10  
製造販売元  
株式会社 雪の元本店  
奈良県橿原市大谷町182番地

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931

製造番号 使用期限

2301-AHI