

**アレルギー性鼻炎、急性鼻炎などによる  
鼻水・鼻づまりに  
レチナート点鼻薬α  
第2類医薬品 30mL**

**第2類医薬品**  
販売名：レチナート点鼻薬α  
**【保管及び取り扱い上の注意】**  
1.直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。  
2.小児の手の届かない所に保管してください。  
3.他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。  
4.他の人と共用しないでください。  
5.使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。又、開封後は期限内であっても品質保持の点からなるべく早く使用してください。

本剤についてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。  
日本生物製薬株式会社  
お客様相談室  
T E L 03-5615-8520  
F A X 03-5615-8273  
受付時間 9:00～12:00  
13:00～18:00  
(土曜、日曜、祝日を除く)  
副作用被害救済制度 電話 0120-149-931

発売元  
**日本生物製薬株式会社**  
製造販売元  
**株式会社 雪の元本店**  
奈良県橿原市大谷町182番地

箱 ラベル キャップ  
ノズル ボトル

4 979949 002122

**アレルギー性鼻炎、  
急性鼻炎などによる  
鼻水・鼻づまりに  
5つの有効成分  
配合  
クールな  
さし心地**

**関係部位**    **症 状**  
皮膚 発発・発赤・かゆみ  
鼻 はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

**症状の名称**    **症 状**  
ショック 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声の嗄れ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**開封口**

**【効能・効果】**  
急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

**【用法・用量】**  
成人(15歳以上)及び7歳以上の小児：1回に1～2滴ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

**使用方法**

① 容器をもち、液が鼻漏するまで、はねを2～3回押してください。  
② ノズルはね  
③ 鼻腔に息を吸い込みながら、鼻腔内に噴霧してください。

(液が残っている音はするか出ない時)  
容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりますので、必ず上向きにして使用してください。

使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等でふきとり、キャップをしてください。

ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

**【用法・用量に関連する注意】**

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 点鼻用にのみ使用し、内服しないでください。

**【成分・分量】** (100mL中)  
ナファソリソニン塩酸塩…………… 50 mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩…………… 500 mg  
リドカイン…………… 500 mg  
ベンゼトーム塩化物…………… 20 mg  
グリデルリシン酸二カリウム…………… 300 mg  
添加物、ブリセリン、エタノール、塩化Na、pH調節剤、香料

1