

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

花粉症・ハウスダストなどによる鼻みず・鼻づまりに【アレルギー専用点鼻薬】

ロートアルガード® ST鼻炎スプレー

第2類医薬品

アレルギー発生を原因から抑えこむ【クロモグリク酸ナトリウム配合】

ロートアルガード® ST鼻炎スプレー のはたらき…

ロートアルガードST鼻炎スプレーは抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」を配合したすぐれた効き目のアレルギー専用点鼻薬です。抗アレルギー剤「クロモグリク酸ナトリウム」がアレルギーに関係する細胞に的確にはたらきかけ、花粉などのアレルギーが体内に入ってきてても、鼻みず・鼻づまりをひきおこす原因物質が体内にひろがらないように、そこで抑え込むすぐれた効果があります。また、「クロルフェニラミンマレイン酸塩」が、すでに起こってしまった鼻みずや鼻づまりについても鎮めてくれます。花粉症やハウスダストによる症状に、きちんとしたご使用が効果的です。

アレルギー発生の原理



花粉等の抗原が抗体に付くことで細胞膜が破れ、鼻みず・鼻づまりのもととなるヒスタミン等が放出されます。

クロモグリク酸ナトリウムの働き



クロモグリク酸ナトリウムは細胞膜を破れにくくすることでアレルギーの発生(ヒスタミン等の放出)を原因から抑えます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 使用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがある)
2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
 - (5) 次の診断を受けた人: 高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
 - (6) アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
鼻	刺激感、出血、はれ
精神神経系	頭痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる

3. 3日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
4. 症状の改善がみられても2週間を超えて使用する場合は、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:鼻みず(鼻汁過多)、鼻づまり、くしゃみ、頭重(頭が重い)

用法・用量

次の量を両鼻腔内に噴霧してください。

年齢	1回量	1日使用回数
7才以上	1度ずつ	3~5回 (3時間以上の間隔をあけること)
7才未満	使用しないこと	






3日間使用しても症状の改善がみられない場合には使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。

■用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 7才以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 点鼻用にのみ使用してください。

鼻炎スプレーの使い方

使う前にていねいに鼻をかんでください(あまりきつくかまないこと)

使い方	開閉方法	使用後は
<p>1 図のように容器を持ってください。</p>  <p>フック ノズル</p> <p>使い始めは数回、空押ししてください。</p> <p>2 ノズルを軽く鼻腔内に入れ、静かに息をすいこみながら、フックを押してください。</p>  <p>ミクロの霧が鼻腔内のすみずみにまで行きわたります。</p>	<p>あけ方 ツイストキャップを手前にひねってください。</p>  <p>しめ方 ツイストキャップを音がするまで押し下げてください。</p> 	<p>清潔なティッシュペーパー等で、ノズルを拭いてください。</p> 

成分・分量

クロモグリク酸ナトリウム…1% クロルフェニラミンマレイン酸塩…0.25% ナファゾリン 塩酸塩…0.025%
ベンゼトニウム塩化物…0.005%

添加物として、エドト酸Na、クロロブタノール、エタノール、リン酸水素Na、リン酸二水素Na、ℓ-メントール、ポリソルベート80、グリセリン、CMC-Na、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 他の人と共用しないでください。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

401300501