

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう保管してください。

第2類医薬品

# くしゃみ・鼻みず 鼻づまりに

ピュアロップ点鼻薬クール  
鼻炎用点鼻薬

鼻みず、鼻づまりは、かぜ又は花粉やほこりなどが原因で、鼻の粘膜にはれや充血が生じたときに多くみられます。ピュアロップ点鼻薬クールはスプレー式で、鼻腔内に一定量のお薬を噴霧するため、有効成分が均一にひろがり、不快な鼻炎症状を緩和し、鼻の通りをよくします。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人には使用しないでください  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 長期連用しないでください



### 相談すること

1. 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：  
鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)

## 【用法・用量】




次の量を、鼻腔内に噴霧してください。

年 令	1 回量	1 日使用回数
成人(15才以上) 及び7才以上の小児	1～2度ずつ噴霧	3時間以上の間隔をおいて、6回以内
7才未満		使用しないこと

### <用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用のにみ使用してください。

### (使用方法)

<p>1. キャップをはずします。</p> <p>2. 初めてご使用の際は、液が噴霧するまで はね部を数回、空押ししてください。</p> <p>3. 右図のように容器を持ち、ノズルを鼻腔内に少し差し入れます。</p> 	<p>4. 静かに息を吸い込みながら、はねを下まで押し、1回に1～2度ずつ噴霧してください。</p> <p>*できるだけ垂直に近い角度でお使いください。</p> <p>5. 使用後は清潔なティッシュペーパーやガーゼなどでノズルを拭き、キャップをして保管してください。</p> 	<p>[液が残っている音はするが出ない時]</p> <p>液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。緩やかなカーブがついていますので容器をかたむけずお使い頂くと、むだなくお使いいただけます。</p>  <p>容器断面図</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 【成分・分量】 100mL中

成 分	分 量	は た ら き
ナファゾリン塩酸塩	50mg	はれや充血を抑え、炎症を改善します。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg	くしゃみ、鼻みずなどのアレルギー症状を緩和します。
リドカイン	300mg	かゆみ、痛みを抑え、不快感をやわらげます。
ベンゼトニウム塩化物	20mg	鼻腔内の殺菌・消毒をし、炎症の改善をたすけます。

添加物として、pH調節剤、等張化剤、l-メントールを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり、品質が変わるのを防ぐため)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
また開封後は使用期限内であってもなるべく速やかに使用してください。



このお薬についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記へお願いいたします。

奥田製薬株式会社 お客様相談窓口

☎ 06-6351-2100(代表) 受付時間 9:00～17:00(土日祝日を除く)

発売元 **三井薬品株式会社**

東京都千代田区若岩本町2-10-2 神田ウサミビル8階

製造販売元



**奥田製薬株式会社**

大阪市北区天満1丁目4番5号

https://www.okudaseiyaku.co.jp/