

使用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

## 鼻炎用点鼻薬

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎などの鼻づまり、鼻みずに

# ジキナ<sup>®</sup>N鼻炎スプレー

〈スプレー剤〉

◆4つの有効成分がづらい鼻づまり、鼻みず等を改善します。

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 長期連用しないでください。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人  
(4) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

裏面もお読みください。

## 効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻みず（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

## 用法・用量

年齢	1回量	使用回数
成人(15才以上)及び7才以上の小児	1回に1～2度ずつ	1日6回まで
7才未満	使用しないこと	
3時間以上の間隔をおいて、鼻腔内に噴霧してください。		

### 〈用法・用量に関連する注意〉



- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起すことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用してください。

### 〈使用方法〉

①キャップをはずして図のようにノズルを指でしっかりはさんでください。初めてご使用の際は、液が噴霧するまで、はね部を2～3回押してください。

②静かに息を吸い込みながら、1回1～2度ずつ鼻腔内に噴霧してください。(噴霧時は容器を横にしないでください。)

③使用後はノズルを清潔なティッシュペーパー等で拭いて、キャップを閉めてください。



## 成分・分量

100mL 中

成分	分量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	50mg	鼻粘膜の腫れや充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	500mg	鼻づまり、鼻みずなどのアレルギー症状を緩和します。
リドカイン	300mg	鼻粘膜のかゆみ、痛みを抑えます。
ベンゼトニウム塩化物	20mg	鼻粘膜の細菌の増殖を抑え、鼻腔内を清潔に保ちます。

添加物：グリセリン、エデト酸Na水和物、クエン酸水和物、L-メントール、ハッカ油、エタノール 含有

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先：株式会社富士薬品(学術室)

電話：048-648-1118 9:00～17:30(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **株式会社富士薬品**  
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目383番地