

この添付文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読み下さい。

ちくのう症に カラビスト[®] シリーズ ビノーゼ

第2類医薬品

販売名：ビノーゼ

【鼻炎・副鼻腔炎用生薬製剤】

- ◆ ビノーゼは、蓄膿症などによる鼻づまりの症状や急性・慢性鼻炎を改善するために考え出された9種類の生薬から成る生薬製剤です。
- ◆ ビノーゼ中のキキョウ・キジツ・シャクヤクは鼻腔・副鼻腔内に溜まった膿汁を排泄するように働き、カンゾウ・ジュウヤク・ソウジ・ビャクシは鼻に生じる不快な症状を改善し、シンイ・センキュウは蓄膿症や鼻炎の改善を早めるように働きます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 胃腸の弱い人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱、むくみ
 - (6) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位(急性鼻カタルに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 他の医薬品等を併用する場合には、含有成分の重複に注意する必要があるので、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

蓄膿症、急性慢性鼻カタル^{a)}、肥厚性鼻炎^{b)}、臭鼻症^{c)}

a)鼻カタル：鼻炎のことを示します。

b)肥厚性鼻炎：鼻粘膜が肥厚して鼻閉を起こす鼻炎のことを示します。

c)臭鼻症：膿性の鼻汁や鼻の中のかさぶたのために悪臭がする鼻炎のことを示します。

用法・用量

次の量を食後に水又はお湯で服用してください。

年 齢	1 回量	服用回数
成人(15才以上)	1包	1 日 3 回
12才以上15才未満	2/3包	
7才以上12才未満	1/2包	
4才以上7才未満	1/3包	
4才未満	× 服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

本剤 3包(3.6g)中

(カシグウ 1.0g・ジユウヤク 2.0g)エキス 2.1mL(固形物として0.10g)
キキヨウ 2.0g・キジツ 1.0g・ジユウヤク 1.5g } エキス 3.0mL(固形物として1.0 g)
センキュウ 1.0g・ソウジ 3.0g・ビヤクシ 1.0g }
シャクヤク末 1.5g、シンイ末 1.0g

- ・本剤は灰褐色で、特異なにおいを有し、味は苦い散剤です。
- ・本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがあります、効果に変わりはありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

ビノーゼは生薬の特性を活かした生薬製剤ですので、あなたの体質や病状を考えて正しく服用することが大切です。

あなたの病気を早く治すため、お薬の服用に際しては、ビノーゼのことをご理解いただいている薬局・薬店の先生方とよくご相談下さい。

お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記にお願いします。

剤盛堂薬品株式会社 学術部

電話 073(472)3111(代表)

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00

(土、日、祝日を除く)

製造販売元

剤盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号