

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

□腔咽喉薬

第3類医薬品

のどの痛み、のどのはれに
ペラック[®]T細粒クール
抗炎症成分配合

ペラックT細粒クールの特徴

ペラックT細粒クールは、炎症やアレルギーをおさえる作用のあるトラネキサム酸、カンゾウ乾燥エキスの他に、タンパク質や脂質の代謝に関与し、皮膚や粘膜の機能を正常にはたらかせるビタミンB₂、ビタミンB₆と体力消耗に効果のあるビタミンCの3種のビタミンを配合した薬です。

空気の乾燥・汚れやかぜなどからくるのどの炎症である咽頭炎・扁桃炎（のどの痛み、のどのはれ）によく効き、7歳の小児から服用できる薬です。

●トラネキサム酸配合

炎症やアレルギーをおさえる作用のあるトラネキサム酸を、成人（15歳以上）1日量あたり750mg配合しています。

●のどの痛み、のどのはれにすぐれた効果

トラネキサム酸とカンゾウ乾燥エキスの2つの成分が有効に作用して、のどの炎症をおさえます。

●眠くなる成分を含みません

抗ヒスタミン剤を配合していませんので、眠くなりません。

●ヒンヤリ冷たい服用感

清涼感のある細粒剤です。スティックタイプなので携帯にも便利です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないで下さい。

フェニルケトン尿症の人（本剤はL-フェニルアラニン化合物を含んでいます）

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

(1) 甘草（カンゾウ）又はその主成分グリチルリチンを含有する内服薬

（むくみ、血圧上昇及び筋疾患（ミオパチー）等が起こることがあります）

(2) トラネキサム酸を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬等）

3. 長期連用しないで下さい。



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(3) 高齢者

(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(5) 次の症状のある人 むくみ

(6) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病、血栓のある人（脳血栓、心筋梗塞、血栓性静脈炎等）、血栓症を起こすおそれのある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位 | 症 状 |
|-------|-------------------------------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消 化 器 | 吐き気・嘔吐、胸やけ、食欲不振もしくは食欲増進、胃部不快感 |
| 精神神経系 | めまい |
| 泌 尿 器 | 頻尿 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|---|
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。下痢

4. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

■ 効能・効果

咽頭炎・扁桃炎（のどの痛み、のどのはれ）、口内炎

■ 用法・用量

次の量を水又はお湯で服用して下さい。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------------------|
| 成人（15歳以上） | 1包 | 3回 朝昼晩に服用して下さい。 |
| 7歳以上15歳未満 | 1/2包 | |
| 7歳未満 | 服用しないで下さい。 | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 食前・食後、いずれの服用でもかまいません。
- (3) 7歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

■ 成分・分量

本剤は褐色の細粒で、3包（1包1.3g）中に次の成分を含有しています。

| 成分 | 分量 | はたらき |
|------------------------------------|------------------------|---|
| トラネキサム酸 | 750mg | 炎症やアレルギー症状が起こっているとき、体内で異常増加している酵素（プラスミン）をおさえ、口内やのどにおける痛み、はれなどの症状を改善します。 |
| カンゾウ乾燥エキス | 198mg (原生薬として990mg) | 生薬、甘草のエキスで、主成分のグリチルリチン酸は、炎症やアレルギーをおさえる作用があります。 |
| ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆) | 50mg | 皮膚や粘膜の機能を正常にはたらかせる作用があります。 |
| リボフラビン (ビタミンB ₂) | 12mg | |
| L-アスコルビン酸ナトリウム (ビタミンCナトリウム) | 500mg | |

添加物：無水ケイ酸、ステアリン酸Mg、カラメル、エリスリトール、マクロゴール、
L-メントール、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤に配合されているリボフラビン（ビタミンB₂）により、尿が黄色になることがあります。
- (2) 本剤の服用により、尿及び便の検査値に影響を与えることがあります。医師の検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師に知らせて下さい。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®登録商標

 販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
Daiichi-Sankyo 東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町滝879番地