



咽喉塗布剤

第3類医薬品

DP

**\* 使用上の注意のつづき**

- (4) 薬などによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (5) 口内又はのどのひどいただれのある人。
  - (6) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
  - (7) 患部が広範囲の人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみり、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しき等があらわれる。

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度の問合せ先  
 (独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

**【効能効果】** のどの殺菌・消毒  
**【用法用量】** 適宜、適量を患部に塗布してください。

- 〈用法用量に関連する注意〉**
- (1) 用法用量を厳守してください。
  - (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意してください。
  - (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
  - (4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
  - (5) 塗布用のみ使用してください。
  - (6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けてください。

**【成分分量】** 100 mL中 ヨウ素 0.5g含有  
 添加物：ヨウ化カリウム、グリセリン、ハッカ油  
**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
  - (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
  - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
  - (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 〈貯法〉 気密容器。遮光して室温保存。



製造番号  
 使用期限

第3類医薬品

咽喉塗布剤  
**ケンエール  
 ゴールソフト**

KENEI LUGOL SOFT

50g

のどの殺菌・消毒に

**健栄製薬株式会社**  
 大阪府中央区伏見町2丁目5番5号  
 電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。  
 また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ケンエールゴールソフト 第3類医薬品

ケンエールゴールソフトは、日本薬局方複方ヨード・グリセリンの刺激を緩和し、適用しやすいように改良した咽喉塗布剤です。適度な粘稠性を有するグリセリンに、殺菌・消毒作用を示すヨウ素を配合し、清涼感のあるハッカ油を加え風味を整えています。

**⚠ 使用上の注意**

してはいいこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください  
 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。

\*以下右側面へ

