

Throat Repair Medicine

□腔咽喉薬

販売名：のどぬーるナイトクト

第3類医薬品

△ 使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 長期連用しないこと

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の症状のある人：□内のひどいだけ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感、吐き気

3. 使用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

□の刺激感

4. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

MADE IN JAPAN
10232183



箱



キャップ

【効能・効果】のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれのどのあれ・のどの不快感・声がれ、□内炎
【用法・用量】1日数回、適量を患部に噴射塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1) のどの炎症の場合には、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(4) 噴射塗布のみに使用すること(5) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

【成分・分量】100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物……………0.02g
セチルピリジニウム塩化物水和物……………0.3g
添加物として、プロピレングリコール、ヒプロメロース、サッカリンNa、リン酸ト水素Na、リン酸水素Na、エタノール、トメントールを含有する

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること(2) 小児の手の届かない所に保管すること(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること●使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

あつたらしいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市彩都葉生北44-66