

△ 使用上の注意

❌ (してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分、ポビドンヨード(ヨウ素)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 甲状腺疾患のある人 (3) 2才未満の乳幼児

2. 長期連用しないこと 3. 大量に噴射しないこと

■ (相談すること)

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 口内のひどいただれ
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5～6日間使用しても症状がよくなるない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

Throat
Disinfectant

第3類医薬品

口腔咽喉薬

販売名: のどぬーるスプレーキッズd
(効能・効果) のどの炎症によるのどあれ、のどいたみ、のどのはれ、のどの不快感・声がれ
(用法・用量) 1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください

<用法・用量に関連する注意>

(1) ノズルをのどの患部に向けて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある) (2) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること (3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること (4) のど用のみ使用すること (5) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

(成分・分量) 100mL中
ポビドンヨード……………0.45g
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、香料を含有する

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください。使用期限を過ぎた製品は使用しないこと

(保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとめて立てて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること●携帯する場合は、添付のビニール袋に入れること●使用中に薬液がこぼれ衣類などが着色したら、すぐに水洗いすること●液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針などで突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あったらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

副作用被害救済制度
☎0120-149-931