

Throat
Disinfectant [第3類医薬品]

口腔咽喉薬

販売名: のどぬーるスプレー^{キッズC}
〔効能・効果〕のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ
〔用法・用量〕1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください

＜用法・用量に関する注意＞
(1) ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら噴射すること(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがある)(2) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用されること(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること(4) のど用にのみ使用すること(5) 薬液を誤って大量に飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること

〔成分・分量〕100mL中
ポビドンヨード……………0.45g
添加物として、ヨウ化K、グリセリン、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、L-メントール、香料を含有する

火気厳禁 第二石油類 危険等級Ⅲ
エタノール含有物 水溶性

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

△使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分、ポビドンヨード(ヨウ素)によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 甲状腺疾患のある人 (3) 2才未満の乳幼児

2. 長期連用しないこと 3. 大量に噴射しないこと

⚑ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人は (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 口内のひどいただれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は
使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください。使用期限(パッケージ底面及び容器ラベルに記載)を過ぎた製品は使用しないこと

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、キャップをしっかりとしめて立てて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わること) (4) 火気に近づけないこと(エタノール含有物)

● 使用後は、必ずキャップをしてノズルをもとの位置にもどして保管すること ● 携帯する場合は、添付のビニール袋に入ること ● 使用中に薬液がこぼれ衣類等が着色したら、すぐに水洗いすること ● 液が出ないときは、液が出るまでくり返し押すこと。またノズルの先端を針等で突かないこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

＼あつたらいいな／をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問合せ先(お客様相談室)

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3