

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

のどの痛み・声がれ・口臭の除去に

第3類医薬品

口腔咽喉薬

第一トローチL

第一トローチLは、セチルピリジニウム塩化物水和物、リゾチーム塩酸塩、キキョウエキスを配合したトローチ剤で、口の中でなめらかに溶け、のどの痛み・はれ、声がれ、口腔内の殺菌・消毒及び口臭の除去など、のどの不快な症状に優れた効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (ステイブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

- 口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去
- のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

裏面も必ずお読みください

【用法・用量】

次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1 回 量	1 日 使 用 量	使 用 間 隔
5 才 以 上	1 錠	6 回	2 時 間 以 上
5 才 未 満 の 乳 幼 児	使 用 し な い で く だ さ い。		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、飲み込んだりしないでください。
- (4) 本剤は5才未満の乳幼児には、使用させないでください。
- (5) トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



【成分・分量と作用】

6錠(1日量)中

(1錠:1.2g)

成 分	分 量	作 用
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg	殺菌作用をもち、細菌の感染を予防します。
リゾチーム塩酸塩	36mg (力価)	のどの粘膜に作用し、周辺の組織を強化し、修復を促進します。それによって消炎・感染予防の働きをします。
キキョウエキス	150mg (キキョウとして600mg)	気道の粘液分泌を増加させます。

添加物として還元麦芽糖水アメ、精製白糖、ゼラチン、マクロゴール、黄色5号、ポビドン、ステアリン酸Ca、l-メントール、アラビアゴム、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し日数を経ると、湿気の多いときは変色することがあります。ご使用の残りは特に湿気に注意し、変色したものは使用しないでください。
- (5) 表示の期限（外箱に記載）を過ぎたものは使用しないでください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室
〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1
☎0120-415-688
受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931