

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

口腔咽喉薬

第2類医薬品

ピロチームストローチ[®]

風邪、タバコの吸いすぎ、のどの使いすぎのほか、空気の汚れによる抵抗力の衰えものどがはれて痛んだり、ガラガラして声がかれたりする大きな原因となっています。

「ピロチームストローチ」は、のどのはれにすぐれた効果をあらわすリゾチーム塩酸塩と悪化の原因となる細菌の感染・増殖を防ぐクロルヘキシジン塩酸塩を配合したトローチ剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分、鶏卵、クロルヘキシジンによりアレルギー症状を起こしたことがある人



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 葉などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- ・のどの炎症による次の症状
のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・声がれ・のどの不快感
- ・口内の殺菌・消毒
- ・口臭の除去

用法・用量

成人（15才以上）、1回1個、1日4～5回、口の中がかまずに溶かしながら使用してください

<用法・用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守してください
- (2)かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください

成分・分量

1個中に次の成分を含んでいます

成分	含量	はたらき
リゾチーム塩酸塩	7.5mg (力価)	のどのはれをとるとともに、炎症によって生じた粘液を分解して不快な症状を取り除きます
クロルヘキシジン塩酸塩	5mg	のどに付着したいろいろな細菌の増殖を抑え、炎症が悪化するのを防ぎます


添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、トメントール、デンプン部分加水分解物、トコフェロール、香料、サンセットイエローFCF、白糖、シヨ糖脂肪酸エステルを含有しています


保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- (2)小児の手の届かない所に保管してください
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わる）
- (4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください

本製品についてのお問い合わせ先

- ・お買い求めのお店
- ・日邦薬品工業株式会社 学術情報室
住 所：〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-46-16
電 話：(03)3370-7174（代表）
受付時間：午前9：00から午後5：00まで（土、日、祝日を除く）

発 売 元  **日邦薬品工業株式会社**
東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元  **日東薬品工業株式会社**
京都府向日市上植野町南開35-3