

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

口腔咽喉薬

チョコラBB[®] 口内炎リペアショット

第3類医薬品

口内炎やのどの炎症でお食事がしみにたり、話すのがつらいことはありませんか。チョコラBB口内炎リペアショットは、口内炎とのどの炎症によるのどの痛みにも効果的なスプレー剤です。チョコラBB口内炎リペアショットは殺菌と粘膜修復のW作用で患部に直接効果を発揮します。持ち運びに便利で、手が汚れにくいスプレータイプ(キャップ付)です。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる】

長期連用しないでください。



相談すること

① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
口内のひどいただれ

② 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感
消化器	胃部不快感、吐き気

③ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

口内炎、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布して用いてください。

成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。


[用法・用量に関連する注意]

- ①用法・用量を厳守してください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③のどや口内の患部の塗布用のみ使用し、内服しないでください。
- ④息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、のどに使用する場合には、噴射口をのどの患部に向けて、息または声を出しながら噴射してください。
- ⑤目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

[容器の使用法]

キャップをとり、口元に容器を近づけ、噴射口を患部に向けてポンプ頭部を押して噴射してください。

- ※初回使用時は、薬液が出るまで空押しをしてください。
- ※ポンプを押す際は、半押しではなく、下までしっかり押ししてください。
- ※1日数回、1回1～3噴射を目安に使用してください。



成分と働き

100mL中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	20mg	粘膜を修復し、患部の治癒を促進します。
セチルピリジニウム塩化物水和物	300mg	患部を殺菌します。

[添加物]

安息香酸ベンジル、エタノール、グリセリン、サッカリンNa、D-ソルビトール、プロピレングリコール、ミツロウ、トメントール、リン酸水素Na、香料、リン酸二水素Na

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- ②ボトルの側面に強い力がかかると、液モレの原因となる可能性があります。
- ③小児の手の届かないところに保管してください。
- ④他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ⑤薬液が衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。
- ⑥使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「hhcホットライン」 **フリーダイヤル 0120-161-454**
受付時間/平日9:00～18:00(土・日・祝日9:00～17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

製造販売元

福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

4HC
KAH1