

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# 口腔咽喉薬 コデビタAZのどスプレー

第3類医薬品

のどの使いすぎ、汚れた空気、自動車の排気ガスの吸い込み、乾燥した空気を吸いすぎるとのどに炎症が生じ、のどの痛み、のどのはれといった症状が現れることがあります。

コデビタAZのどスプレーはカミツレ由来成分「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物」を主成分とし、メントールを配合したさわやかなのどスプレーです。

「アズレンスルホン酸ナトリウム水和物」の消炎作用により、患部の炎症をおさえてのどの痛みや不快感、はれを取り除きます。また、口内炎にも効果があります。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (3)口内のただれがひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
口	刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎。

### 【用法・用量】


1日数回適量を患部に噴射塗布して用いてください。

## <用法・用量に関する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)のどや患部の塗布用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、噴射口をのどや口内の患部に向けて、声を出しながら噴射してください。
- (5)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬる湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

## <ご使用方法>

①ポンプ全体を指で支えて、ノズルを起こし、キャップを矢印方向に引いて取りはずしてください。



②頭部を2~3回押して適量を患部に噴射してください。押し方が弱いと液だけをする場合がありますので、ノズルの先端最初は液が出るまで空押しを行ってください。



③使用後はポンプ全体を指で支えてキャップをはめ、ノズルをもとの位置にもどして高温直射日光を避け保管してください。



※携帯する時は液もれを防ぐためキャップをしっかりとはめ、添付のビニール袋に入れ、しっかりと封をしてください。  
※キャップをしたまま噴射すると、キャップがとび、飲み込むおそれがありますので、必ずキャップを取ってから噴射してください。

## 【成分・分量】 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物……………20mg

添加物として、マクロゴール、グリセリン、プロピレングリコール、キシリトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、無水リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素ナトリウム水和物、メントール、サッカリンナトリウム水和物、ハッカ水、ベンゼトニウム塩化物、香料を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをはめて立てて保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
4. 携帯するときは、必ずキャップをして添付のグリーンの袋に入れてください。
5. ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。
6. キャップをしたまま噴射すると、キャップがとび、飲みこむおそれがありますので、必ずキャップを取ってから噴射してください。
7. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記まで  
ご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

電話：0748-52-2323

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度  
電話：0120-149-931

製造 福地製薬株式会社  
販売元 滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

KLH1