



複方 日本薬局方

# ヨード・グリセリン

販売名: 複方ヨード・グリセリン「昭和JP  
ルゴール液

第2類医薬品

第2類医薬品


60mL

複方 日本薬局方

# ヨード・グリセリン

販売名: 複方ヨード・グリセリン「昭和JP  
ルゴール液

のどの殺菌・消毒に



昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12  
お問い合わせ 06-6996-5111

**【効能・効果】**  
のどの殺菌・消毒

**【用法・用量】**

適宜、適量を患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>

- 定められた用法を厳守すること。
- 小児に使用させる場合には保護者の指導監督のもとに使用させること。
- 塗布用にのみ使用し、内服しないこと。
- のどに塗るとき、綿棒に薬液をしみこませすぎないように注意すること。
- 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤って飲み込んだときは、直ちに医師の診療を受けること。

**【成分・分量】** 100mL中

ヨウ素1.2g、液状フェノール0.5mL

添加物: ヨウ化カリウム、グリセリン、ハッカ水を含む。

製造  
番号

使用  
期限



4 950498 113125



## 【使用上の注意】

### してはいけないこと

次の人は使用しないこと。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人は。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。  
　　口内又はのどのひどいだれ。
- (7) 次の診断を受けた人。  
　　甲状腺の疾患。
- (8) 患部が広範囲の人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり、品質が変わること)。
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931



:箱



:ボトル  
:キャップ  
:フィルム