

のどスプレーAC

第3類医薬品 30mL

口腔咽喉薬

この箱はお薬とともに保管し、
使用の際にはよくお読みください。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 口内にひどいだれのある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
口	刺激感
消化器	胃部不快感、吐き気

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合には使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

用法・用量に関する注意

- (1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) のどや口内への塗布用にのみ使用し、内服しないでください。(4) 薬液が気管支や肺に入ることがありますので、口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、噴射口をのどや口内の患部に向けて、アーチ声を出しながら噴射してください。(5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

成分・分量 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム
水和物 20mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 300mg
添加物: L-メントール、クエン酸ナトリウム水和物、プロビレングリコール、濃グリセリン、香料

MADE IN JAPAN

**のどの痛み
はれ・口内炎に****のどスプレーAC**

第3類医薬品 30mL

**のどの痛み
はれ・口内炎に****W
ダブル処方**消炎成分
アズレン殺菌成分
CPCつらい患部に
直接届く!**のどスプレーAC**

第3類医薬品 30mL

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にオーバーキャップをはめて箱に入れ、立てて保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4) 薬液が衣類に付着した場合は、すぐに水又は洗剤で洗ってください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6) 火気に近づけないでください。

ご使用方法

- 初めてお使いになるときは、オーバーキャップをはずし、液が出るまで数回空押してください。●使用後、ノズルの部分に液が付着したときは、清潔なティッシュペーパー等でふいてからオーバーキャップをかぶせてください。●ノズルの先端を針等で突くと薬液が出てくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

【製造販売元】
昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

お問い合わせ先

昭和製薬株式会社
電話: 0120-920-598
時間: 9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
0120-149-931

Sug1609

製造番号
使用期限
紙箱

