

のどの痛み はれ・口内炎に

のどスプレー AC

第3類医薬品 30mL

のどスプレー AC

第3類医薬品 30mL

□ 腔咽喉薬

この箱はお薬とともに保管し、
使用の際にはよくお読みください。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
長期連用しないでください。

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 口内にひどいただれのある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感
消化器	胃部不快感、吐き気

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合には使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

用法・用量

1日回数適量を患部に噴射塗布してください。

用法・用量に関連する注意

(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3) のどや口内への塗布用のみ使用し、内服しないでください。(4) 薬液が気管支や肺に入ることがありますので、口を開けてできるだけ口元に容器を近づけ、噴射口をのどや口内の患部に向けて、アーと声を出しながら噴射してください。(5) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

成分・分量 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物20mg
セチルピリジニウム塩化物水和物300mg
添加物：トメントール、クエン酸ナトリウム水和物、プロピレングリコール、濃グリセリン、香料

MADE IN JAPAN

のどの痛み・はれ 口内炎に

消炎成分
アズレン

殺菌成分
CPC

ダブル
処方

つらい患部に
直接届く!



のどの
痛み・はれ
口内炎に

のどスプレー AC
第3類医薬品 30mL

のどスプレー AC

第3類医薬品 30mL

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所にストッパーをはめて箱に入れ、立てて保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。(4) 薬液が衣類に付着した場合は、すぐに水または洗剤で洗ってください。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。(6) 火気に近づけないでください。

ご使用方法

- 初めてお使いになるときは、ストッパーをはずし、液が出るまで回数空押ししてください。
- 使用后、ノズルの部分に液が付着したときは、清潔なティッシュペーパー等でふいてからストッパーをかぶせてください。
- ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対にやめください。

【製造販売元】

昭和製薬株式会社
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

お問い合わせ先

昭和製薬株式会社
電話：0120-920-598
時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)
副作用被害救済制度
0120-149-931

製造
番号
使用
期限



Sug2401