

## 浅田飴 のどクールスプレー

## △ご使用上の注意

してはいけないこと



【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください。

## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人

(2) 授乳中の人

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

(4) 口内にひどいだれのある人

(5) 甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
口	あれ・しみる・灼熱感・刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれくしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

## 【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

## 【用法・用量】

1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

●定められた用法、用量を厳守してください。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

●のどの塗布用にのみ使用してください。

●ノズルをのどの患部に向けて、アーッと声を出しながら噴射してください(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります)。

●目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

【成分・分量】 100mL中  
ポビドンヨード 0.45g  
添加物としてヨウ化K、DL-リンゴ酸、グリセリン、メントール、エタノール、香料含有

●本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。

(4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

(5) 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。

●お問い合わせ先、お客様相談室  
電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)  
時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)製造販売元 ジャパンパッティング株式会社  
富山県富山市横越168発売元 株式会社 浅田飴  
東京都多摩市久米川町5-29-7●お問い合わせ先、お客様相談室  
電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)  
時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)製造販売元 ジャパンパッティング株式会社  
富山県富山市横越168

30mL

第3類医薬品

A 浅田飴  
のどクール  
スプレー  
ポビドンヨード配合

副作用救済制度 0120-149-931

4 987206 034533

COOL  
ウィルス・細菌などを  
殺菌する  
ポビドンヨード配合  
浅田飴  
のどクール  
スプレー

痛み・はれ

不快感・声がれ




①

キャップをはずしてください。  
※最初は液が出来るまで空押しきを行ってください。

②

ノズルは回転できます。



③

ノズルの先端を患部に向けて、噴射塗布してください。  
※吸入しないようにアーッと声を出しながら噴射してください。

④

使用後はきちんとキャップをはめて保管してください。

