

開封時に記入してください
年月日

年月日

使用方法

①容器のフタをはずしてください。

②「ア」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2~3回直射してください。
※最初は薬液が出来るまで4~5回押してください。
※薬液がノズルの先端にたまつた時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。

③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。

抗炎症成分配合
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

パープルショット 30mL

2308A06

4 935583 204599

製造番号
使用期限

パープルショット
30mL 第3類医薬品

SHIROGANE

口腔咽喉薬 第3類医薬品

のどの炎症による
つらいのどの
痛み・口内炎に
のどスプレー

**第3類医薬品
パープルショット**

のどの炎症によるのどの
効能・効果 のどの痛み・のどのはれ・
のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン) 0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロビレンジコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、バラベン、メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入替えなければならない。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 薬液が衣服等に付着した場合はすぐに水でよく洗い落してください。(5) ノズルの先端の穴を針等で塞がないでください。使用時に薬液が出てくくなことがあります。(6) 火気には近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帶び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用をお控えください。

発売元:白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
製造販売元:ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

紙箱 外装フィルム:PP

開封口

販売名:パープルショット
ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 口内のただれがひどい人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 症状が悪化した場合。
3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に間違する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回噴射してください。
- (3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

matsu kiyo

For sore throat pain caused by inflammation and for mouth sores.

Throat Spray
のどの炎症による
のどの痛みに

【使用方法】

①容器のフタをはずしてください。

②「ア~」と声を出しながら頭部を押して、喉部に薬液を2~3回直射してください。

* 最初は液が出来るまで4~5回押してください。

* 薬液がノズルの先端にたまつた時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。

③使用後は、フタをもとの位置にはめしてください。

ノズルの先端を針等で突くと薬液が出てこなくなり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

紙箱 **外装フィルム: PP**

matsu kiyo

Throat Spray パープルショット

30mL
1日数回

**のどの炎症による
のどの痛みに**

薬のはたらき

- のどの痛み
- のどの不快感
- 口内炎

アゼンスルホン酸ナトリウム水和物
（水溶性アズレン）……………0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、ラバベン、L-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 1mL中

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落してください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。(6)火気には近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元 白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)
製造 ダイヤ製薬株式会社
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931
※この商品は(株)マツキヨココカラカンパニーのオリジナル商品です。

パープルショット

こんな方におすすめ

- のどの炎症によるのどの痛みでお困りの方
- 口内炎でお困りの方
- のどの不快感を抑えたい方

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な部分を読めるように大切に保管してください。

使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 口内のただれがひどい人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

 - (1) 症状が悪化した場合。
 - 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。
(用法・用量に関する注意)

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回噴射してください。
- (3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

製造番号

使用期限

VEGETABLE OIL INK

FSC **ミックス パッケージ** **FSC C003630**

1mL中

第3類医薬品

Barcode

4 935583 204049

Barcode

* 2 4 0 6 0 0 9 *

2024年6月改訂第9版


第3類医薬品

水溶性アズレン配合 のどフレッシュ パープルショット


開封時に記入してください

開封年月日
年
月
日

[使用方法]




①容器のフタをはずしてください。



②「ア」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2~3回直射してください。

*最初は薬液が出るまで4~5回押してください。

*薬液がノズルの先端にたまつ時は、液れを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。



* 2 3 0 9 C 0 6 *

2023年9月改訂第6版

のど フレッシュ

水溶性
アズレン配合

第3類医薬品

30mL(ノンガスタイプ)



製造番号

使用期限



第3類医薬品
パープルショット

のどの炎症によるどあれ・
効能・効果 のどの痛み・のどのはれ・
のどの不快感・声がれ・口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)

アズレンスルホ酸ナトリウム水和物
(水溶性アズレン) 0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水
アメ、プロビングリコール、クエン酸、
クエン酸Na、エタノール、パラベン、L-
メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わることがあります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落してください。(5)ノズルの先端の穴を針等で空かないでください。使用時に薬液が出てくくなることがあります。(6)火気には近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帶び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用をお控えください。

発売元:白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元:ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931

紙 箱 フラ 外装フィルム:PP

日邦

開封口

第3類
医薬品

販売名:パープルショット

ご使用に際して、この説明文書(ケース)を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)口内のただれがひどい人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書(ケース)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮ふ又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

(1)症状が悪化した場合。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書(ケース)を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関する注意〉

(1)定められた用法・用量を守ってください。
(2)息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回噴射してください。
(3)塗布のみの使用し、内服しないでください。
(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。