

開封年月日
年 月 日
開封時に記入してください

使用方法




①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2〜3回直射してください。

※最初は薬液が出るまで4〜5回押ししてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。



口腔咽喉薬 第3類医薬品

パープルショット
30mL 第3類医薬品

のどの炎症による
つらいのどの
痛み・口内炎に
のどスプレー

抗炎症成分配合

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物

パープルショット 30mL



第3類医薬品

パープルショット

のどの炎症によるのどあれ・
効能・効果 のどの痛み・のどのはれ・
のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン) 0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水
アメル、プロピレングリコール、クエン酸、
クエン酸Na、エタノール、パラベン、
メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になり品質が変わる場合があります。)(4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落とすようにしてください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：ダイエー製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用発症回数 0120-149-931

紙箱 外装フィルム：PP

開封口

第3類
医薬品

販売名：パープルショット

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△使用上の注意

■相違すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 口内のたれがひどい人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感
(1) 症状が悪化した場合。 3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。	

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2〜3回噴射してください。
- (3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

2308A06




4 935583 204599

製造番号

使用期限

開封後、必ずお読みください。
※ 開封後は、必ずお読みください。

【使用方法】




① 容器のフタをはずしてください。



② 「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。

※ 最初は液が出るまで4～5回押してください。

※ 薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

紙箱 外装フィルム: PP

matsu kiyo

For sore throat pain caused by inflammation and for mouth sores.

Throat Spray

のどの炎症による
のどの痛み

30mL

Several times a day

matsu kiyo

Throat Spray
パープルショット

30mL

1日数回

のどの炎症による のどの痛み



薬のはたらき

のどの痛み

のどの不快感

口内炎

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物:0.2mg

・のどの痛みやはれの原因である炎症をおさえる

口腔咽喉薬

第3類医薬品

1mL中



製造番号

使用期限

効能・効果

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)……………0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、l-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6)火気に近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元 白倉製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間 9:00～17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

製造 ダイワ製薬株式会社
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931
※この商品は(株)マツキヨコフからカンパニーのオリジナル商品です。

ミックス
パッケージ
FSC FSC® C003830

VEGETABLE
OIL INK



2024年6月改訂第9版

パープルショット

第3類
医薬品

こんな方におすすめ

- のどの炎症によるのどあれ、のどの痛みでお困りの方
- 口内炎でお困りの方
- のどの不快感を抑えたい方

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に決めるように大切に保管してください。

使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 口内のたれがひどい人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

(1) 症状が悪化した場合。
3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

- 1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。
(用法・用量に関連する注意)
(1) 定められた用法・用量を守ってください。
(2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回直射してください。
(3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

第3類医薬品


水溶性アズレン配合 のどフレッシュ パープルショット

開封年月日
年 月 日
開封時に必ず記入してください

【使用方法】




① 容器のフタをはずしてください。



② 「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。

※最初は薬液が出るまで4～5回押ししてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。



2023年9月改訂第6版

のどフレッシュ

パープルショット

のどの炎症

のどの痛み

声がれ

水溶性
アズレン配合

第3類医薬品

30mL (ノンガスタイプ)



製造番号

使用期限



第3類医薬品

パープルショット

のどの炎症によるのどあれ・
効能・効果 のどの痛み・のどのはれ・
のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)
アズレンスルホンナトリウム水和物 (水溶性アズレン) 0.2mg

添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パラベン、8-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(貯留の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度 ☎0120-149-931

紙箱 外装フィルム：PP

開封口

第3類
医薬品

販売名：パープルショット

ご使用に際して、この説明文書(ケース)を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

Ⅷ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。

(2) 口内のただれがひどい人。

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書(ケース)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚又は口腔	発疹・発赤、かゆみ又は刺激感

(1) 症状が悪化した場合。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書(ケース)を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。


〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回噴射してください。
- (3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。


日邦

つらい
のどの痛み・
口内炎に
by amazon

【使用方法】



①容器のフタをはず
してください。



②「アー」と声を出しながら頭部を
押して、患部に薬液を2～3回
直射してください。

※ 最初は薬液が出るまで4～5回押し
てください。

※ 薬液がノズルの先端にたまったとき
は、液だれを防ぐため清潔なティッシュ
ペーパーなどで拭き取ってください。



③使用後は、フタを
もとの位置にはめ
てください。



ノズルの先端を針で突くと薬液が
出にくくなったり、折れたとき大変
危険です。絶対におやめください。

紙箱 外装フィルム:
PP

□腔咽喉薬

つらい
のどの痛み・
口内炎に
抗炎症成分配合*
のどスプレー

by amazon

*アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
…0.2mg(本剤1mL中)



30mL

第3類医薬品

パープルショット

つらい
のどの痛み・
口内炎に
by amazon

ご使用に際して、この説明書を必ず
お読みください。また、必要なときに読
めるように大切に保管してください。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

●定められた用法・用量を守ってください。
●息を吸いながら使用すると、薬液
が気管支や肺に入ることがありますの
で、ノズルを患部にむけて、軽く息をは
きながら、2～3回直射してください。●塗
布にのみ使用し、内服しないでください。
●小児に使用させる場合には、保護者の
指導監督のもとに使用させてください。
●目に入らないよう注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水また
はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療
を受けてください。

保管および取り扱い上の注意

●直射日光の当たらない涼しい所に保管
してください。●小児の手の届かない所
に保管してください。●他の容器に入れ
替えないでください。(誤用の原因になっ
たり品質が変わる場合があります。)●薬
液が衣服などに付着すると着色します。
なお、付着した場合はすぐに水でよく洗
い落としてください。●ノズルの先端の
穴を針などで突かないでください。使用
時に薬液が出にくくなることがあります。
●火気に近づけないでください。●使用
期限をすぎた製品は、使用しないでくだ
さい。●本品使用後の一定時間は、呼吸
中に酒気帯び運転と判定される濃度以上
のアルコール濃度が検出される可能性
がありますので、運転中のご使用はお控
えください。



by Amazon ブランドストア

開封口

第3類医薬品

30mL

販売名: パープルショット

成分・分量 本剤1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)…0.2mg
添加物としてグリセリン、還元麦芽糖水アメ、プロピレ
ングリコール、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、パ
ラベン、l-メントール、pH調整剤、香料を含有する。

効能・効果

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・
のどの不快感・声がれ、口内炎

使用上の注意

■相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師また
は登録販売者に相談してください。
(1)医師または歯科医師の治療を受けている人。
(2)口内のただれがひどい人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたこ
とがある人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用
の可能性があるので直ちに使用を中止し、この
説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師また
は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚または口腔	発疹・発赤、かゆみまたは刺激感

- (1)症状が悪化した場合。
3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使
用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医
師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

発売元 白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製 造 ダイヤ製薬株式会社
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

2409H01



製造番号
使用期限