

開封時に記入してください

年 月 日

開封年月日

使用方法



① 容器のフタをはずしてください。




② 「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2〜3回噴射してください。

※ 最初は薬液が出るまで4〜5回押ししてください。

※ 薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。

※ 温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひらなどで温めてから使用してください。



③ 使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

ディアポピー
30mL 第3類医薬品



口腔咽喉薬 第3類医薬品

のどの炎症による
つらいのどの
痛み・はれに
のどスプレー

殺菌成分配合
ポビドンヨード

ディアポピー 30mL

第3類医薬品
ディアポピー

のどの炎症によるのどあれ・
効能・効果 のどの痛み・のどのはれ・
のどの不快感・声がれ

成分・分量 (100mL中)
ポビドンヨード 0.45g

添加物としてヨウ化カリウム、*l*-メントール、還元麦芽糖水アメ、グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、サッカリンナトリウム水和物、香料を含有する。
(成分・分量に関連する注意)
本剤の使用により、顔に含有する歯科材料(歯肉等)が変色することがあります。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(4) 誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。(5) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひらなどで温めてから使用してください。(9) 火気に近づけないでください。

発売元：白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
副作用等相談室 ☎0120-149-931



外装フィルム：PP

開封口

第3類
医薬品

販売名：ディアポピー

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

使用上の注意

※ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 長期連用しないでください。

■ 相薬すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。(4) 次の症状のある人。口内のひびきたれ。(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(6) 授乳中の人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診断を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は、
使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

(用法・用量に関連する注意)(1) 定められた用法・用量を守ってください。(2) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルを唇にむけて、軽く息をはきながら、2〜3回連続してください。(3) 本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、鼻ややけどへの使用や、内服はしないでください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けてください。

2308A07



4 935583 204605

製造番号
使用期限

開封年月日
年 月 日
開封時に記入してください

のど

スプレー

第3類医薬品

S SELECT
スエロセレクト

のど

スプレー



のどの炎症による
痛み・ハレ
声がれに



のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・
のどのハレ・のどの不快感・声がれ


第3類医薬品

30mL

使用方法



① 容器のフタをは
すしてください。




② 「アー」と声を出しながら頭部を
押して、患部に薬液を2〜3回
直射してください。

※ 最初は薬液が出るまで4〜5回
押してください。

※ 薬液がノズルの先端にたまった
時は、液だれを防ぐため清潔な
ティッシュペーパー等で拭き取っ
てください。

※ 温度の低い場所で保管された場
合、薬液が出にくくなることがあ
ります。その場合は手のひらなど
で温めてから使用してください。



③ 使用後は、フタをもとの位置に
はめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液
が出にくくなったり、折れた時大変
危険です。絶対におやめください。

第3類医薬品

ディアポピー

のどの炎症によるのどあれ・
効能・効果 のどの痛み・のどのハレ・
のどの不快感・声がれ

成分・分量 (100mL中)
ポリドキシド 0.45g

添加物としてヨウ化カリウム、L-メン
トール、還元麦芽糖水アメ、グリセリン、ブ
ロヒングリコール、エタノール、サッカ
リンナトリウム水和物、香料を含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉
本剤の使用により、銀を含有する歯科材料
（歯面等）が変色することがあります。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に
保管してください。(2) 小児の手の届
かない所に保管してください。(3) 他
の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わる
場合があります。）(4) 薬液が衣服等に
付着すると着色します。付着した場合は
すぐに水でよく洗い落とすしてくだ
さい。(5) ノズルの先端の穴を針等で突
かないでください。使用時に薬液が出
にくくなることがあります。(6) 使用
期限を過ぎた製品は、使用しないでく
ださい。(7) 温度の低い場所で保管さ
れた場合、薬液が出にくくなる場合が
あります。その場合は手のひらなどで
温めてから使用してください。(8) 火
気近づけないでください。

発売元：白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00〜17:00（土、日、祝日を除く）
製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
副作用救済制度 ☎0120-149-931

紙箱 外装フィルム：PP

開封口

第3類
医薬品

販売名：ディアポピー

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が増えやすくなりま
す。）1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりア
レルギー症状を起こしたことがある人。2. 長期連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相
談してください。(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 次
の診断を受けた人。中状腺機能障害。(4) 次の症状のある人。口内
のひどいだれ。(5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(6) 授
乳中の人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可
能性があるので直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、
歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦 しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は、
使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回用量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 定められた用法・用量を守ってください。
(2) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがあります
ので、ノズルを患部にむけて、軽く息をはきながら、2〜3回直射してく
ださい。(3) 本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、鼻や口への
使用や、内服はしないでください。(4) 小児に使用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに使用させてください。(5) 目に入らないよう注意し
てください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗っ
てください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

2406D06



製造番号

使用期限

SG

3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。