



30mL
Several times a day

Throat Spray

For severe irritation and swelling caused by inflammation of the throat. Fresh mint fragrance.


開封後毎日

日
日
日
開封日に記してください

【使用方法】



①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2〜3回直射してください。

- ※ 最初は液が出るまで4〜5回押しください。
- ※ 薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。
- ※ 温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひらなどで温めてから使用してください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出なくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。



外装フィルム: PP



Throat Spray
ポピシヨットα 30mL
1日数回

のどの炎症による つらいのどの あれ・ハレに



スックリミントの香り

薬のはたらき

- のどの痛み
- のどの不快感
- 声がれ

ポピドンヨード:
4.5mg

のどの患部を
殺菌する

1mL中

□ 腔咽喉薬

第3類医薬品



4 935583 204087

製造番号

使用期限

効能・効果
のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

成分・分量 1mL中
ポピドンヨード 4.5mg
添加物としてヨウ化カルウム、β-メントール、グリセリン、プロピレングリコール、還元麦芽糖水アメ、サッカリンNa、エタノール、香料を含有する。
(成分・分量に関連する注意)
本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保管及び取り扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(7)温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひらなどで温めてから使用してください。(8)火気に近づけないでください。

発売元 白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
お客様相談室 TEL: 0744-21-5588
受付時間 9:00~17:00
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

製造 ダイヤ製薬株式会社
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
副作用被害救済制度 ☎0120(149)931
※この商品は(株)マツキヨココカラ &カンパニーのオリジナル商品です。



* 2 5 0 3 A 1 0 *

2025年3月改訂第10版

ポピシヨットα

第3類
医薬品

こんな方におすすめ

- のどの炎症によるのどあれ、のどの痛みでお困りの方
- のどの不快感でお困りの方
- 殺菌して、のどの炎症を抑えたい方
(有効成分ポピドンヨード)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

※【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2. 長期連用しないでください。

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。(4)次の症状のある人。口内のひどいたれ。(5)妊娠又は妊娠していると思われる人。(6)授乳中の人。2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくなりない場合は、使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。
(用法・用量に関連する注意) (1)定められた用法・用量を守ってください。(2)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルを患部に向けて、軽く息をはきながら、2〜3回直射してください。(3)本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、鼻や口への使用や、内服はしないでください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。(5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医師の診断を受けてください。