

matsu  
kiyo

Throat Spray

口腔咽喉薬 ポピショットα

# のどの炎症による つらいのどの あれ・ハレに

＋のどの痛み  
＋のどの不快感  
＋声がれ



すっきりミント  
の香り

成分 1mL中

・ポビドンヨード:4.5mg  
のどの患部を殺菌する



第3類医薬品

## 効能・効果

のどの炎症によるのどあれ・のどの  
痛み・のどのハレ・のどの不快感・  
声がれ

## 成分・分量 1mL中

ポビドンヨード……………4.5mg

添加物としてヨウ化カリウム、ℓ-メントール、グリセリン、プロピレングリコール、還元麦芽糖水アメ、サッカリンNa、エタノール、香料を含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

## 保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(7)温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひら等で温めてから使用してください。(8)火気に近づけないでください。

発売元 白金製薬株式会社  
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588

受付時間 9:00～17:00  
(土日祝日・年末年始・夏季など特別休業日を除く)

製造 ダイア製薬株式会社  
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

※この商品は(株)マツキヨココカラ  
&カンパニーのオリジナル商品です。

## ポピショットα

### こんな方におすすめ

- のどの炎症によるのどあれ、のどの痛みでお困りの方
- のどの不快感でお困りの方
- 殺菌して、のどの炎症を抑えたい方  
(有効成分:ポビドンヨード)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

### △使用上の注意

#### ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)  
1.次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.長期連用しないでください。

#### ■相談すること

1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。(4)次の症状のある人。口内のひどいただれ。(5)妊婦又は妊娠していると思われる人。(6)授乳中の人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるため直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位  | 症 状            |
|-------|----------------|
| □     | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 消 化 器 | 吐き気            |
| そ の 他 | 不快感            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称              | 症 状                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、<br>声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦<br>しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |


3.5～6日間使用しても症状がよくなる場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を守ってください。(2)息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルを患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回直射してください。(3)本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、傷ややけどへの使用や、内服はしないでください。(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

## 【使用方法】



- ※最初は液が出るまで4～5回押してください。
- ※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。
- ※温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひら等で温めてから使用してください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。