

AZプラスCPCのどスプレー

この箱はお薬とともに保管し、使用の際には、よくお読みください。

△ ご使用上の注意

⊗ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]

長期連用しないでください。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 口内にひどいただれのある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気

3. 使用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、使用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

口の刺激感

4. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合には使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【用法・用量】



1 日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- のどや口内への塗布用にのみ使用してください。
- 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けてください。


第3類医薬品

口腔咽喉薬

〔使用方法〕



② 「アー」と声を出しながら頭部を押して、適量を患部に噴射塗布してください。
※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

副作用救済制度 0120-149-931



紙箱



外装フィルム

内容量:30mL

【効能・効果】

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【成分・分量】1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
(水溶性アズレン)……0.2mg
セチルピリジニウム塩化物水和物
(CPC)……3mg

添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、l-メントール、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5) 薬液がこぼれ衣類などに付着した場合には、すぐに水又は洗剤で洗ってください。
- (6) 火気に近づけないでください。

発売元 **株式会社 浅田 飴**
東京都東村山市久米川町5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室
電話 03-3953-4044(ダイヤルイン)
時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
奈良県橿原市上品寺町515