

開封前にお読みください
年 月 日

HapYcom

30mL

パープルショットW

第3類医薬品

のどの炎症による
のどの痛み




1日数回適量を患部に噴射塗布

使用方法



①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2〜3回直射してください。

※最初液が出るまで4〜5回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出てくったり折れた等大変危険です。絶対にやめください。



MADE IN JAPAN



2020年5月改訂第4版

HapYcom

のどスプレー

のどの炎症による

のどの

痛み

あれ 不快感

パープルショットW



殺菌成分 CPC

消炎成分 水溶性アズレン

内容量 30mL 第3類医薬品



製造番号

使用期限

口腔咽喉薬 Throat Spray

第3類医薬品

パープルショットW

のどの炎症によるのどの痛み・のどの不快感・声がか、口内炎

成分・分量 (本剤1mL中)	
アズレンスルホンナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	0.2mg
セチルトリジニウム塩化水和物 (CPC)	3mg

添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出てくることがあります。(6)火気と近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼吸中に溶気揮り運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元:白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL.0744-21-5588

受付時間9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元:ダイヤ製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度 ☎0120-149-931

開封口

第3類
医薬品

販売名:パープルショットW

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△使用上の注意

■(相談すること)

1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)口内のただれがひどい人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気
口	刺激感

(1)症状が悪化した場合。
3.5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)定められた用法・用量を守ってください。
(2)息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2〜3回噴射してください。
(3)塗布の際に使用し、内服しないでください。
(4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。



外装フィルム:PP