



2012年3月初版

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

口腔咽喉薬

第3類医薬品

のどの炎症による痛み、ハレ、声がれ

ポピスロート
のどスプレー



特長

- ・有効成分「ポピドンヨード」がのどの炎症の原因となっている細菌などを殺菌します。
- ・メントールを配合していますので、口の中がスッキリします。
- ・患部に薬液がまっすぐ届くノズルを使用しています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。
- (4) 次の症状のある人。口内のひどいだれ。
- (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (6) 授乳中の人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診断を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は、使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 【効能・効果】 のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ
 【成分・分量】 100mL中 ポビドンヨード……………0.45g
 添加物としてヨウ化カリウム、*l*-メントール、還元麦芽糖水アメ、グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、サッカリンナトリウム水和物、香料を含有する。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【用法・用量】 1 回数過量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。


〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルを患部にむけて、軽く息をはきながら、2~3回直射してください。
- (3) 本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、傷ややけどへの使用や、内服はしないでください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けてください。

〈使用方法〉

- ①容器のフタをはずしてください。



- ②「アー」と声を出しながら頭部を押して患部に薬液を2~3回直射してください。


※最初は薬液が出るまで4~5回押ししてください。

※頭部をゆっくり押さないでください。液だれを起こす場合があります。



- ③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため、清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



ノズルの先端を針等で突くと折れた時大変危険です。絶対におやめください。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えたりしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 携帯する時は添付のチャック袋に入れ、しっかりと封をしてください。
- (6) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (8) 温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひらなどで温めてから使用してください。

本製品について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

発売元 **グレートアンドグランド株式会社** 製造販売元 **ダイヤ製薬株式会社**
 〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)