

開封口



第3類医薬品

口腔内消毒剤

販売名：アズプッシュW

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に認めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

● (相談すること)

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 3口内のただれがひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気
口	刺激感

- 症状が悪化した場合、35～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【用法・用量】 1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。
【用法・用量に関する注意】

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルのどの患部に向けて、軽く息をきながら、2～3回噴射してください。
- 塗布のみ使用し、内服しないでください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとで使用させてください。
- 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。




箱




外装フィルム：PP

開封後毎日
使用
いよいよ入るよ

【使用方法】



- ※ 最初には薬液が出るまで4～5回押してください。
- ※ 薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。
- ※ 温度の低い場所で保管された場合、薬液が出にくくなる場合があります。その場合は手のひらなどで温めてから使用してください。



2018年4月初版

のどの痛み

声がかれ・口内炎に

アズプッシュW

のどスプレー

第3類医薬品

のどの痛み

声がかれ・口内炎に

アズプッシュW

のどスプレー

殺菌成分
CPC

消炎成分
水溶性アズレン

W^{ダブル}有効成分^{配合}



30mL

さわやかメントール味

第3類医薬品

【効能・効果】
のどの炎症によるのどの痛み・のどのほれ、のどのあれ・のどの不快感・声がかれ、口内炎
【容 量】 30mL
【成分・分量】 (本剤1mL中)
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)……………0.2mg
セチルピリジニウム塩化物水合物(CPC)……………3mg

添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、 β -メントール、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、香料を含有する。

【保管及び取り扱い上の注意】
(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手が届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(服用の原因になったり品質が変わる場合があります)。(4) 薬液が衣類等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなる場合があります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼気中に湿気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性があります。そのため、運転中のご使用は控えさせていただきます。

発売元：白銀製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上島寺町1515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
製造販売所 0900-1700(土、日、祝日を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上島寺町1515

副作用情報請求 費0120-149-931



4 935583 204490

製造番号

使用期限