

消炎のどスプレー

のどの 炎症による痛み

はれ・あれ・不快感・口内炎


第3類医薬品

開封時に記入してください
日
月
日

使用方法




①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。

※最初は液が出るまで4～5回押ししてください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタを元の位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。



外装フィルム：PP

日本調剤企画
5COINS
PHARMA

消炎のどスプレー

のどの 炎症による痛み

はれ・あれ・不快感・口内炎

消炎成分/殺菌成分配合

アズルンスルホン酸ナトリウム水和物
セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)配合



30mL 第3類医薬品

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのはれ・不快感・声がかれ、口内炎

成分・分量 本剤1mL中

アズルンスルホン酸ナトリウム水和物	0.2mg
セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)	3mg

添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、L-メントール、クエン酸、フエン酸Na、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4) 薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5) ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。(6) 火気に近づけないでください。(7) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8) 本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00～17:00(土、祝日を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度 ☎0120-149-931

開封口

第3類
医薬品

販売名：のどスプレー-AZC

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

使用上の注意

※ [してはいけないこと]

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
長期連用しないでください。

※ [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 口内のただれがひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1) 皮膚 発疹・発赤、かゆみ
(2) 消化器 胃部不快感、吐き気
(3) 刺激感

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気
□	刺激感

(1) 症状が悪化した場合。
3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日回数、適量を患部に噴射塗布してください。

(用法・用量に関連する注意)

(1) 定められた用法・用量を守ってください。
(2) 息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部において、軽く息をはきながら、2～3回噴射してください。

(3) 塗布にのみ使用し、内服しないでください。
(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(5) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

2501B02



製造番号

使用期限