

開封年月日
年 月 日
開封時に記入してください


パープルショットAZC

30mL 第3類医薬品




口腔咽喉薬 第3類医薬品

使用方法




①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。

※最初は薬液が出るまで4～5回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまった時は、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパー等で拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。



ノズルの先端を針等で突くと薬液が出にくくなったり、折れた時大変危険です。絶対におやめください。

のどの炎症による
つらいのどの
痛み・口内炎に
のどスプレー

抗炎症成分配合

アズレンスルホン酸
ナトリウム水和物

殺菌成分配合

セチルピリジニウム
塩化物水和物

パープルショットAZC 30mL



第3類医薬品

パープルショットAZC

のどの炎症によるのどの痛み・
効果・効果 のどのはれ・のどのあれ・
のどの不快感・声がれ、口内炎

成分・分量（本剤1mL中）

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物 (水溶性アズレン)	0.2mg
セチルピリジニウム塩化物水和物 (CPC)	3mg

添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、香料を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)(4)薬液が衣服等に付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。(5)ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。(6)火気に近づけないでください。(7)使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。(8)本品使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。

発売元：白金製薬株式会社

〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元：ダイヤ製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

副作用救済制度 ☎0120-149-831



外装フィルム：PP

開封口

第3類
医薬品

販売名：パープルショットAZC

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】
長期連用しないでください。

■ 相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(3)口内のただれがひどい人。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気
口	刺激感

- (1)症状が悪化した場合。
- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を守ってください。
- (2)息を吸いこみながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回噴射してください。
- (3)塗布にのみ使用し、内服しないでください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

2401A01




製造番号


使用期限

のどの炎症による
つらいのどの痛み・
口内炎に
by amazon

【使用方法】




①容器のフタをはずしてください。



②「アー」と声を出しながら頭部を押して、患部に薬液を2～3回直射してください。

※最初は薬液が出るまで4～5回押してください。

※薬液がノズルの先端にたまったときは、液だれを防ぐため清潔なティッシュペーパーなどで拭き取ってください。



③使用後は、フタをもとの位置にはめてください。

口腔咽喉薬

のどの炎症による
つらいのどの痛み・
口内炎に

抗炎症成分配合*1・殺菌成分配合*2

のどスプレー

by amazon

*1 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物…0.2mg
*2 セチルピリジニウム塩化物水和物 ……3mg
(本剤1mL中)



30mL

第3類医薬品

パープルショット
AZC



のどの炎症による
つらいのどの痛み・
口内炎に
by amazon
30mL

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

こんな方におすすめ

- のどの炎症によるつらいのどの痛みでお困りの方
- 口内炎でお困りの方
- 殺菌して、のどの炎症を抑えたい方
(殺菌成分：セチルピリジニウム塩化物水和物)
- アズレンスルホン酸ナトリウム水和物…0.2mg
- のどの痛みやはれの原因である炎症をおさえる
セチルピリジニウム塩化物水和物 ……3mg
- のどの患部を殺菌する

用法・用量

1日数回、適量を患部に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を守ってください。●息を吸いながら使用すると、薬液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら、2～3回直射してください。●塗布にのみ使用し、内服しないでください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

保管および取り扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- 薬液が衣服などに付着すると着色します。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。●ノズルの先端の穴を針などで突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。●火気に近づけないでください。●使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。●本品使用後の一定時間は、呼吸中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中のご使用はお控えください。



by Amazon
ブランドストア

開封口

第3類医薬品

30mL

販売名：パープルショットAZC

成分・分量 本剤1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)…0.2mg
セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC) ……3mg
添加物として還元麦芽糖水アメ、グリセリン、エタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ℓ-メントール、クエン酸、クエン酸Na、pH調整剤、香料を含有する。

効能・効果

のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)長期連用しないでください。

⚠️相談すること

1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。(1)医師または歯科医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)口内のたれがひどい人。
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感、吐き気
口	刺激感

(1)症状が悪化した場合。

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

発売元 白金製薬株式会社
〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515

お客様相談室 TEL：0744-21-5588
受付時間9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

製 造 ダイヤ製薬株式会社
販売元 〒634-0803 奈良県橿原市上品寺町515
副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

紙箱 外装フィルム：PP

2409B01



製造番号
使用期限