



複方ヨード・グリセリン

第2類医薬品

60mL



日本薬局方

複方ヨード・グリセリン

第2類医薬品

60mL

発売元

丸石製薬株式会社

大阪市鶴見区今津中2-4-2

使用に際してこのケースの説明文をよくお読み下さい。  
また、必要ときに読めるよう大切に保管して下さい。

**【使用上の注意】**

**【してはいけないこと】**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

**次の人は使用しないこと**

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

**相談すること**

**1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 口内又はのどのひどいだれのある人。
- (6) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
- (7) 患部が広範囲の人。

**2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 口    | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器  | 吐き気            |
| その他  | 不快感            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称       | 症 状  |
|-------------|--|
| アナフィラキシー様症状 | 使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。 |

**3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、このケースを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること**

**【効能・効果】**  
のどの殺菌・消毒

**【用法・用量】**

適宜、適量を患部に塗布する。

**【用法・用量に関連する注意】**

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 塗布用のみ使用し、内服しないこと。
- (6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること。

**【成分・分量】**

ヨウ素1.2w/v%、液状フェノール0.5w/v%、グリセリン90v/v%、添加物としてハッカ水、ヨウ化カリウムを含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

**【お問合せ先】**

丸石製薬株式会社 学術情報グループ  
大阪市鶴見区今津中2-4-2  
TEL: 0120-014-561

**副作用被害救済制度**

☎0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造番号

使用期限



製造販売元

日興製薬株式会社

岐阜県羽島市江吉良町1593

