

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

のどのあれ・痛み・不快感、声がれに

DHC のどスプレー

<口腔咽喉薬>

ボビドン
ヨード処方

第3類医薬品

DHCのどスプレーは、のどのあれや痛みなどのある患部に直接噴射する、のど用のお薬です。風邪だけでなく、タバコや排気ガス、花粉、ホコリなどの吸入によるのどの炎症・あれ・痛みにもお使いいただけます。ノンガス・タイプ。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。

(2) 授乳中の人は。

(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(5) ヨウ素によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6) 次の症状のある人。

口内のひどいだれ

(7) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

裏面も必ずお読みください。

■ 効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ、のどの痛み、のどのはれ、のどの不快感、声がれ

■ 用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

- のどの患部にノズルをむけて、軽く息をはきながら、ピュッピュッと2~3回直射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。)
- 本剤はのどの患部への噴射塗布だけに使用し、キズややけどの使用や、内服はしないでください。
- 目に入らないよう注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 定められた用法、用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【使用方法】

口を大きくあけて、のどの患部に直射し、1回2~3噴射を目安に、1日3~5回使用してください。なお、のどに噴射した薬液は、そのままのみ込んでも影響ありません。

●最初は衣服等を汚さないよう気を付けながら液が出るまで4~5回押してください。

●キャップがしっかりとまつていないと、液もれすることがありますので注意してください。



■ 成分・分量

1mL中

ポビドンヨード	4.5mg
---------	-------	-------

添加物として、L-メントール、グリセリン、ヨウ化カリウム、サッカリンナトリウム、エタノールを含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 衣服等に付着すると着色するので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落してください。
- 火気に近づけないでください。
- ノズルの先端を針等で突くと折れた時に大変危険ですので、絶対にやめてください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

医薬品
相談室

tel. 03-3762-2581

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製販売元
株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布2-7-1 ☎0120-333-906

DHCホームページ

パソコン <http://www.dhc.co.jp>
携帯 <http://www.dhc.jp>