

この説明文書は使用前に必ずお読みください。また必要なとき読めるように保存しておいてください。

第3類医薬品 のどの炎症によるのどあれ、のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれに

イソジン® のどフレッシュ

いつでもどこでも、シュッとするだけ。
携帯できる、イソジン® のどフレッシュ。

△ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人
2. 長期連用しないでください

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

- (1) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (2) 授乳中の人
- (3) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- (4) 次の症状のある人 内のひどいだれ
- (5) 次の診断を受けた人 甲状腺機能障害

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	消化器	吐き気
<input type="checkbox"/>	あれ、しみる、灼熱感、刺激感	その他	不快感

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。
その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

効能・効果

のどの炎症によるのどあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

用法・用量

1日数回 適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- ノズルをのどの患部にむけて、アーッと声を出しながら2～3回直射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります。)
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 本剤はのどの患部への噴射塗布のみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診察を受けてください。

成分・分量

1mL中 ポビドンヨード4.5mg(有効ヨウ素として0.45mg)
添加物としてトメントール、プロピレングリコール、D-ソルビトール液、グリセリン、エタノール、香料、その他1成分を含有しています。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)
- (4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。
なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 火気に近づけないでください。
- (6) ノズルの先端を針などで突くと折れたときに大変危険ですので、絶対にやめてください。
- (7) 本剤を使用していると最後に噴射しきれずに容器内に薬液が残りますが、表示された内容量を噴射できるよう考慮した量を入れてあります。
- (8) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

〈お問い合わせ先〉

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、

または下記までお願いいたします。

シオノギヘルスケア株式会社「**医薬情報センター**」

電話：[大阪] 06-6209-6948 受付時間：9時～17時(土、日、祝日を除く)
[東京] 03-3406-8450

「副作用被害救済制度」について

(独)医薬品医療機器総合機構

電話：0120-149-931(フリーダイヤル)

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html