

押して  
あける

## ツインノズルスプレーの特徴

のどの  
痛み・はれに **直接効く**

イメージ図



持ち運び  
しやすい  
キャップ付き

**効能・効果** のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・ののはれ・のどの不快感・声がれ  
**用法・用量** 1日数回 適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

**[用法・用量に関する注意]** ●定められた方法・用量を厳守してください。●ノズルをのどの患部にむけて、アームと声帯に出しながら2~3回直射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがあります) ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●本剤はのどの患部への噴射塗布のみに使用し、キスややけへの使用や、内服はしないでください。

●目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

**[販売]**  
**シオノギヘルスケア株式会社**  
大阪市中央区北浜2丁目6番18号

**[製造販売元]**  
**iNova Pharmaceuticals Japan**  
株式会社  
東京都中央区八丁堀4-3-5

この製品は外側を  
透明フィルムで  
ラッピングしています。

®: イソジンはアイノヴァ  
ファーマの登録商標です。

**成分・分量** 1mL中 ポビドンヨード4.5mg(有効ヨウ素として0.45mg)  
添加物として L-メントール、プロピレン  
グリコール、D-ソルベitol液、グリセリン、  
エタノール、香料、その他1成分  
を含有しています。

**[成分・分量に関する注意]** ●本剤の  
使用により、銀を含有する歯科材料  
(義歎など)が変色することがあります。

**保管および取り扱い上の注意** (1)直射  
日光の当たらない涼しい所に保管して  
ください。(2)小児の手の届かない所に  
保管してください。(3)他の容器に  
入れ替えないでください。(誤用  
の原因になったり品質が変化しま  
す)。(4)衣服などに付着すると着色  
しますのでご注意ください。なお、付  
着した場合にはすぐに水でよく洗い  
落としてください。(5)火気には近づけ  
ないでください。(6)ノズルの先端を  
針などで突くと折れたときに大変危  
険ですので、絶対にやめてください。  
(7)本剤を使用していると最後に噴  
射されずに容器内に薬液が残ります  
が、表示された内容量を噴射でき  
るよう考慮した量を入れてあります。  
(8)使用期限をすぎた製品は、使用し  
ないでください。

### お問い合わせ窓口

大阪 06-6209-6948  
東京 03-3406-8450  
受付時間9時~17時(土、日、祝日を除く)

製造  
番号  
使用  
期限

副作用被害救済制度の  
お問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構  
[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931

25mL

イソジン®  
のどフレッシュ

— ポビドンヨード配合 —

のどの痛み・はれに  
**直接効く**



キャップ  
付き

TM

クリアミント風味 第3類医薬品

### △ 使用上の注意

【してはいけないこと】 □ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります) 1. 次の人には使用しないこと □ (本剤または本剤の成分によりアレルギー症候をおこしたことがある人、2. 長期服用しないでください) □ (1)次の人は使用前に医師、薬剤師または看護師にご相談ください (2)妊娠または妊娠している人 (3)乳頭などにアレルギー症候をおこすことがある人、(4)口内のひどいだれのある人 (5)耳や鼻の腫脹感がある人 (6)喉頭等に腫瘻がある場合に使用を中止し、この薬を持って医師、薬剤師または看護師にご相談ください (1)皮膚に発赤、かゆみ (2)口、鼻、しみる、灼熱感、かゆみ (3)喉頭等に腫瘻があることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。まれに下記の症状が現れることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。  
【症状】 キャップ(アラカリシテー)  
【症状】 皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、鼻づまり、鼻水、頭痛、頭痛の混迷などがおこります。  
【症状】 使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持つて医師、薬剤師または看護師にご相談ください。  
【症状】 3~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持つて医師、薬剤師または看護師にご相談ください。