

口内炎・歯肉炎
歯槽膿漏薬

新デスパロー

新デスパローは、痛くてツライ口内炎・歯ぐきのはれや出血に効くクリームタイプの口内炎・歯肉炎・歯槽膿漏薬です。

製品特長

- 5つの有効成分を配合し、抗炎症・粘膜組織修復・殺菌効果を発揮します。
- 2つの粘膜組織修復成分^{*}を配合し、患部の修復促進にすぐれています。
- 歯ぐきのはれや出血など歯肉炎・歯槽膿漏に伴う諸症状にもすぐれた効き目を発揮します。
- ノンステロイドタイプで、お子さまにもご使用いただけます。

※アラントイン、パンテノール

⚠ 使用上の注意



相談すること

- ① 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- ② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

- ③ しばらく使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量 (1g中)

成分・分量		働 き
グリチルリチン酸 二カリウム	4.0mg	抗炎症作用により、炎症を鎮めて、はれを緩和します。
セチルピリジニウム 塩化物水和物	0.5mg	殺菌作用により、患部の細菌汚染を防ぎます。
ヒノキチオール	1.0mg	
アラントイン	3.0mg	組織修復作用により、口内の粘膜組織を修復します。
パンテノール	3.0mg	

[添加物] マクロゴール、カルボキシビニルポリマー、グリセリン、流動パラフィン、ジメチルポリシロキサン、セタノール、ワセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ステアリン酸ソルビタン、パラベン、エドト酸Ca/2Na、水酸化Na、香料

(裏面へ続く)

用法・用量

口内炎	1日2～4回、適量を患部に塗布してください。
歯肉炎・歯槽膿漏	1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指にのせ、歯ぐきに塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- ①用法・用量を守ってください。
- ②小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- ③歯科用にのみ使用してください。
- ④約0.3gの目安量として、約1.5cmとり出して使用してください。

容器の使い方



キャップ上部の突起部でチューブの出し口(アルミシール)にしっかり穴をあけてお使いください。

*使用後は必ずキャップをしっかりしめてください。

*チューブを折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。(チューブが破れる原因となります。)

口内炎に対する使い方

- ①患部の水分やだ液を軽くふきとってください。
- ②乾いた指先に薬剤を適量取り、患部にかぶせるようにうすめに塗布してください。指先で塗布しにくい場合は、清潔な綿棒などを使うと塗布しやすくなります。
- ③塗布した後は、なるべく患部をさわらないようにしてください。

効能・効果

口内炎、歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和

保管及び取扱い上の注意

- ①高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- ④使用期限(外箱及びチューブに記載)をすぎた製品は使用しないでください。

本製品に関するお問い合わせ

お買い求めのお店又は下記へお願いします。

興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センター

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
受付時間:月～金(祝日を除く)9:00～17:00

- 興和製品サイト <https://hc.kowa.co.jp/otc>



製造 興和株式会社

販売元 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14