

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



口内炎薬

# サトウ口内軟膏

消炎剤：アズレンスルホン酸ナトリウム配合

サトウ口内軟膏は…

- 炎症を抑えるアズレンスルホン酸ナトリウム、グリチルレチン酸と、すぐれた殺菌力を持つセチルピリジニウム塩化物水和物を配合した口内炎、舌炎用の軟膏です。
- 付着性の高い基剤を使用していますので、患部に付着しておおうことにより、食べ物がしみたり、接触して痛むのをやわらげます。
- アズレンスルホン酸ナトリウムは、ヨーロッパ原産の植物カミツレの成分“アズレン”を水溶性にしたもので、粘膜に直接的に作用し炎症を抑え、傷ついた粘膜の治りを早めます。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

口内炎、舌炎

〔用法・用量〕

1日2～4回、患部を清浄にした後、本剤の適量を塗布します。

★裏面につづく



## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)口腔用にのみ使用してください。

## 〔成分・分量と働き〕

成分	分量	働き
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.02%	粘膜に直接作用し炎症を鎮め、傷ついた粘膜を治します。
グリチルレチン酸	0.3%	炎症を鎮めて、はれをとります。
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.1%	すぐれた殺菌作用があります。

添加物として、ビタミンE、エデト酸Na、マクロゴール、ポリアクリル酸Na、メタケイ酸アルミン酸Mg、ゲル化炭化水素、香料を含有します。

## ◎保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



## ◎上手な使い方

- (1)患部の唾液を清潔なガーゼ、ティッシュペーパーなどで軽く押しあてて、ふきとります。
- (2)人差し指の先に軟膏を取り、患部にうすくのばします。
- (3)口内の唾液により4～5分ほどでゼリー状となり患部を保護します。

## □口内炎は…

かぜや胃腸障害、貧血、ビタミンB群の欠乏や慢性的な疲労が誘因となったり、口内細菌やウイルスに感染するために起こります。

うがい等で口の中を清潔にし、口内軟膏をつけて患部を保護しましょう。

また、ビタミンB<sub>2</sub>、B<sub>6</sub>を補給すると治りを早める効果があります。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの  
お店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号