



使用に際して、この説明書きを必ずお読みください
また必要なときに読めるように大切に保管してください
使用期限(パッケージおよびチューブに
記載)を過ぎた製品は使用しないこと

販売名: 生葉口内塗薬 **第3類医薬品**

歯痛・歯槽膿漏薬(外用) 内容量 20g Ointments for Pyorrhoea

- ▼ 歯ぐきの出血・腫れ・うみ・痛み・むずがゆさ、口臭など歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状、口内炎に優れた効きめがあります
- ▼ 高粘着性軟膏タイプなので、4つの有効成分が歯周ポケット内に長く留まって効果的に作用し、優れた効きめを発揮します
- ▼ 歯ぐき全体にマッサージしながら塗り込むと効果的です
- ▼ 歯ぐきにスーッとしみ込むような爽やかな使用感です

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
 - (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
その他	味覚異常

3. 5~6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、このパッケージを持って医師、歯科医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状(歯ぐきの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎。

用法・用量 歯肉炎・歯槽膿漏: 1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指にのせ、歯ぐきに塗りこむ。口内炎: 1日2~4回、適量を患部に塗布する。

<用法・用量に関連する注意>(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること(2)歯科用にものみ使用すること

成分・分量(100g中)

有効成分	分量	はたらき
ヒノキチオール	0.1g	殺菌作用
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.05g	殺菌作用
グリチルリチン酸二カルシウム	0.4g	抗炎症作用
アラントイン	0.3g	組織修復作用

添加物として、エデト酸Ca/2Na、クエン酸、ポリソルベート80、ヒプロメロース、CMC-Na、ハッカ油、キシトール、プロピレングリコール、トメントール、緑色3号、黄色4号(タートラジン)、香料を含有する

保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

製品のお問合わせは、お買い求めのお店またはお客様相談室にお願いいたします
MADE IN JAPAN

▼ あつたらいいな/をカタチにする

発売元 **小林製薬株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
製品のお問合せ先 (お客様相談室)
☎ **0120-5884-01**
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製造販売元 **小林製薬株式会社**
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

4つの有効成分が
患部に留まって
じっくり効く

抗炎症
作用

- グリチルリチン酸二カルシウム
(甘草由来成分)

殺菌作用

- ヒノキチオール
(ヒバ含有成分)
- セチルピリジニウム塩化物水和物

組織
修復作用

- アラントイン

歯ぐき全体に
マッサージしながら塗り込むと
効果的です

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

