

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

■【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

ので、直ちに使用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文を持って医師、歯科
医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】 歯周病（歯肉炎・歯周炎）に伴う諸症状（歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・
むずがゆさ、口のねばり、口臭）の緩和、口内炎

【用法・用量】 歯周病（歯肉炎・歯周炎）：1日2回（朝・晩）ブラッシング後、適量（約0.3g）を指又は
ハブラシにつけて歯肉をマッサージするように磨く。口内炎：1日2～4回、適量を患部に塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉（1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに
使用させること。（2）歯科用にはのみ使用すること。

【成分・分量】（1g中）

成分	含量	作用
グリチルリチン酸二カルウム	4mg	歯肉や口内の炎症をしずめる（抗炎症作用）
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	歯周病の原因となる細菌の増殖を抑える（殺菌作用）
パンテノール	4mg	歯肉や口腔粘膜の新陳代謝を促進し、正常な組織へ回復させる（組織修復作用）

添加物として、グリセリン、プロピレングリ
コール、セルロース、ヒドロキシエチルセル
ロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、
γ-シクロデキストリン、酸化チタン、サッカリンNa、リン酸水素Na、ハッカ油、香料、ℓ-メ
ントール、ウイキョウ油、エタノールを含む。

【保管及び取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。（2）小児の手の届かない所に保管
すること。（3）他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わることがある。）

サンスター株式会社 〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1

〈商品のお問い合わせ〉 サンスター株式会社 医薬品インフォメーションセンター

電話：072-682-4815 受付時間：9：00～17：00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

歯周病（歯肉炎・歯周炎）薬 第3類医薬品

メディカルペーストC