

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

**⚠ 使用上の注意**

**■【相談すること】**

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2. 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能・効果】** 歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯内の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

**【用法・用量】** 歯周病(歯肉炎・歯周炎):1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指又は歯ブラシにつけて歯肉をマッサージするように磨く。口内炎:1日2~4回、適量を患部に塗る。

**〈用法・用量に関連する注意〉** (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)歯科用のみ使用すること。

**【成分・分量】(1g中)**

成 分	含 量	作 用
グリチルリチン酸二カリウム	4mg	歯肉や口内の炎症をしずめる(抗炎症作用)
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	歯周病の原因となる細菌の増殖を抑える(殺菌作用)
パンテノール	4mg	歯肉や口腔粘膜の修復促進を促し、正常な組織へ回復させる(組織修復作用)

添加物として、グリセリン、プロピレングリコール、セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、γ-シクロデキストリン、酸化チタン、サッカリンNa、リン酸水素Na、ハッカ油、香料、β-メントール、ウイキョウ油、エタノールを含む。

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)

サンスター株式会社 〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1

〈商品のお問い合わせ〉サンスター株式会社 医薬品インフォメーションセンター

電話:072-682-4815 受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬 第3類医薬品

サンスター メディカルペーストC

2104