

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬

第3類医薬品

販売名

サンスターメディカル軟膏 ペリオ

【製品の特徴】①殺菌②抗炎症③組織修復のトリプル処方で、ハグキの腫れなどの歯周病の諸症状を緩和

⚠ 使用上の注意



【相談すること】

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人
- 使用後、右記の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- しばらく使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ


【効能・効果】歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭)の緩和、口内炎

【用法・用量】歯周病(歯肉炎・歯周炎)：1日2回(朝・晩)ブラッシング後、適量(約0.3g)を指につけて歯肉に塗りこむ。
口内炎：1日2～4回、適量を患部に塗る。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
(2) 歯科用にのみ使用すること。

チューブの使い方

キャップを逆さ向きにして、突起部をチューブの先に強く押し当てて開封してください。




チューブの折り曲げ等による破損に注意すること。

使い方 ～歯周病(歯肉炎・歯周炎)の場合～

① 本剤を使用する前に、歯を磨いて口腔内をきれいにしてください。



② 清潔にした指に本剤を適量(約0.3g)のせます。



③ 口を開き、本剤を直接、患部にあてます。



④ やさしく歯肉に塗りこんでください。



【成分・分量】(1g中)

成 分	含 量	作 用
グリチルリチン酸二カリウム	4mg	歯肉や口内の炎症をしずめる(抗炎症作用)
セチルピリジニウム塩化物水和物	3mg	歯周病の原因となる細菌の増殖を抑える(殺菌作用)
パンテノール	4mg	歯肉や口腔粘膜の新陳代謝を促進し、正常な組織へ回復させる(組織修復作用)

添加物として、ゲル化炭化水素、マクロゴール、ヒプロメロース、ポビドン、ヒマシ油、アンモニオアルキルメタクリレートコポリマー、メタケイ酸アルミン酸Mg、ℓ-メントール、香料、黄色4号(タートラジン)を含む。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは下記にお願いします。
サンスター株式会社 「医薬品インフォメーションセンター」
電話：072-682-4815
受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

サンスター株式会社

〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1