

\*：2014年2月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

この添付文書は、本剤をご服用になる前に、かならずお読みください。  
また、ご服用になる間は、いつでも読めるよう保管しておいてください。

# 漢方胃腸薬

あん ちゅう さん

## ニタンダ 安中散（細粒）

第2類医薬品

「安中散」は、世界最古の薬局方と言われる「和剤局方」に記載されている漢方処方、慢性的に経過した痙攣性疼痛に効果があるとされています。

「ニタンダ安中散（細粒）」は、胃痛・腹痛、胸やけ、神経性胃炎に効果があります。とくに、ストレスによって弱った胃腸や、ふだん胃腸が冷えやすい方の胃腸の不快感に効果があります。

- 〈特徴〉
- 1 漢方処方「安中散」には、成分として「茯苓末」が配合されているものと配合されていないものがあります。「ニタンダ安中散（細粒）」は「茯苓末」が配合されており、胃内に滞った水分の代謝を促進し、胃のもたれや食欲不振の改善に効果を現します。
  - 2 細粒剤ですから大変溶けやすく、また芳香性が高く、服用しやすくなっています。



### 使用上の注意

#### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1カ月位服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

### 〈成分・分量〉

1日量3包(4.299g)中

ケイヒ末	853mg
エンゴサク末	683mg
ボレイ末	683mg
ウイキョウ末	341mg
シュクシャ末	256mg
カンゾウ末	256mg
リョウキョウ末	119mg
ブクリョウ末	853mg

添加物としてセルロースを含有する。

## 〈効能・効果〉

やせ型で腹部筋肉が弛緩する傾向にあり、胃痛または腹痛があって、ときに胸やけ、げっぷ、食欲不振、はきけなどを伴う次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃アトニー

## 〈用法・用量〉

次の1回量を1日3回、食前又は食間、なるべく空腹時に服用して下さい。

食間とは・・・食後2～3時間を指します。

年 齢	1回量
15歳以上	1包
7～14歳	2/3包
4～6歳	1/2包
2～3歳	1/3包
2歳未満	服用しないこと

## 用法・用量に関連する注意

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

※本剤は天然物（生薬）を用いていますので、原料の相違により、細粒の色が多少異なることがあります。効果が異なります。

お問合せ先

二反田薬品工業株式会社 お客様相談室 TEL 0823-31-1515  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



製造販売元

二反田薬品工業株式会社

〒737-0845 広島県呉市吉浦新町2丁目5番2号