

服用前にこの説明書を必ず読むこと。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

第2類医薬品

漢方胃腸薬

# 力明安中散顆粒

安中散は、今から約800年前、中国の宋の時代から胃腸薬として用いられて来た製剤でその名のとおり『胃の中を安心させる』処方です。鎮痛作用のあるエンゴサク、カンゾウ、胃酸の中和作用のあるボレイ、芳香性健胃作用のあるケイヒ、シユクシヤ、ウイキョウ、リョウキョウの組み合わせが弱った胃の働きを活発にします。

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3カ月未満の乳児。



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

胃のもたれ、食欲不振、胸やけ

## 用法・用量

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上	1包	1日3回食間に服用すること
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上7歳未満	1/2包	
2歳以上4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包以下	

(裏面に続きます)

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合のみ服用させること。

**成分・分量** 1日量3包中に次の成分を含む。

成 分	3包中
ケイヒ末	1,000mg
シユクシヤ末	250mg
ウイキョウ末	375mg
リョウキョウ末	125mg
エンゴサク末	750mg
ボレイ末	750mg
カンゾウ末	250mg

添加物：バレイシヨデンブン、ヒドロキシプロピルスターチ、ケイ酸Al、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース

#### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先  
 田村薬品工業株式会社 お客様相談室  
 06-6203-5151  
 受付時間10:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

製造販売元

**田村薬品工業株式会社**  
 奈良県御所市西寺田50