

----- ✂ 切り取り線 -----

Kracie

漢方セラピー 赤みがありかさつく皮膚のかゆみに



**温**  
ウン

**清**  
セイ

**飲**  
イン

T-61

〈効能〉

体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎

(注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状を指します。

〈用法・用量〉

1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	5錠	3回
15才未満7才以上	4錠	
7才未満5才以上	3錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〈成分〉

成人1日の服用量15錠(1錠340mg)中

温清飲エキス(1/2量)…2,800mg

〔トウキ・ジオウ各2.0g、シャクヤク・センキュウ・オウゴン各1.5g、サンシシ〕  
〔1.0g、オウレン・オウバク各0.75gより抽出。〕

添加物として、トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mgを含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります。

〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかりとめて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないでください。

発売元

**クラシエ 薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20(〒108-8080)

ホームページ [www.kracie.co.jp](http://www.kracie.co.jp)

製造販売元

**ジェーピーエス製薬株式会社**

栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1(〒321-3325)

お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先☎0120-149-931

----- ✂ 切り取り線 -----

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりとしめること

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## 第2類医薬品

漢方製剤

温清飲エキス錠J

ウンセイイン

⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記为重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください