

服用に際しては、この添付文書を必ず読んでください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

漢方製剤

第2類医薬品

うんせいいん  
**温清飲エキス錠N「アスゲン」<sup>®</sup>**

「温清飲」は、中国の医学書である「万病回春」<sup>まんびょうかいしゅん</sup>を原典とする漢方薬です。  
皮膚の色つやが悪く、のぼせる方の、月経不順、月経困難、更年期障害、湿疹・皮膚炎などに効果をあらわします。

 **〔使用上の注意〕**



**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
※ 腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるため、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

※ 5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**〔効能・効果〕**

体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：月経不順、月経困難、血の道症、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎

**〈効能・効果に関連する注意〉**

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

## 【用法・用量】

下記1回量を1日3回、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	成人 (15歳以上)	15歳未満 7歳以上	7歳未満 5歳以上	5歳未満
1回量	5錠	4錠	3錠	服用しないこと

### ＜用法・用量に関連する注意＞

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】

成人1日服用量15錠(1錠：0.34g)中に、次の成分を含有します。

温清飲乾燥エキス……………2.8g

トウキ……………2.0g	ジオウ……………2.0g	より抽出
シャクヤク……………1.5g	センキュウ……………1.5g	
オウゴン……………1.5g	サンシシ……………1.0g	
オウレン……………0.75g	オウバク……………0.75g	


添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有します。

### ＜成分・分量に関連する注意＞

本剤は、生薬エキスをを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)ピンのフタはよくしめてください。しめ方が不十分ですと湿気などのため変質することがあります。
- (5)本剤をぬれた手で取り扱わないでください。(水分が錠剤に付くと、変色又は色むらを生じることがあります。)
- (6)ピンの中につめ物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3370-7174(代表)  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

発売元 **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木3丁目46番16号

製造販売元 **アスゲン製薬株式会社**  
岐阜県瑞浪市山田町字小洞2008