

ご使用に際して、この説明書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保管してください。



錠剤 温 清 飲

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振, 胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
* 腸周膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- * 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：

月経不順、月経困難、血の道症^{注)}、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎

〈効能・効果に関連する注意〉

注) 血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

〔用法・用量〕

食前1時間、又は空腹時服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人	4～6錠	3回
7～13歳迄	2～3錠	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

〔成分・分量〕（本品100錠中）

自社製別紙規格					
日局	トウキ末	4.1g	日局	トウキ	4.5g
日局	シャクヤク末	3.1g	日局	ジオウ	4.5g
日局	センキュウ末	3.1g	日局	シャクヤク	3.5g
日局	オウゴン末	3.1g	日局	センキュウ	3.5g
日局	サンシシ末	2.0g	日局	オウゴン	3.5g
日局	オウレン末	1.5g	日局	サンシシ	2.5g
日局	オウバク末	1.5g	日局	オウレン	2.0g
局外生規	ジオウ末	4.1g	日局	オウバク	2.0g

水性
紙工
規格
ス
2.5g

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4)保存の状況が悪いと、場合によっては虫、カビ等がつくことが考えられますので、上記の注意を必ず守ってください。

本剤は、原料として天然の生薬を用いていますので、製品により多少色が異なったり、開栓後、吸湿により錠剤の色が濃くなる場合がありますが、効果には変わりありません。

◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室
 ☎103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2
 電話：03-3281-3363
 受付時間：午前9:00から午後5:00まで
 （土、日、祝日を除く）

発売元 **イスクラ産業株式会社**
 東京都中央区日本橋1-14-2
 製造元 **一元製薬株式会社**
 東京都豊島区要町3-4-10