

◀開封口

開封口



第2類医薬品

漢方煎専科

温清飲

57

5日分10包



自然のちから、ひとに活かして
株式会社 アキザワ漢方廠

(*) : 2020年5月 改訂

第2類医薬品

漢方薬 溫清飲「タキザワ」

20E

△<使用上の注意>



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等があらわれ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症(*)	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。（*）

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。（*）

【成分・分量】		
ト ウ キ	3.0g オ ウ レ ン	1.5g
ジ オ ウ	3.0g オ ウ ゴ ネ	1.5g
シャクヤク	3.0g サンシシ	1.5g
センキュウ	3.0g オ ウ バ ク	1.5g
1日分 (1包9.0g×2)		
18.0g		

【効能・効果】

体力中等度で、皮膚はかさかさして色つやが悪く、のぼせるものの次の諸症：月経不順、月経困難、血道症（注）、更年期障害、神経症、湿疹・皮膚炎
<効能・効果に関連する注意>

血道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。

【用法・用量】

1日2回朝夕の空腹時に、本品1包（1回分）を和紙袋入りのまま、水約300mLを加えて半量ぐらいまで煮つめ、和紙袋を除き、次の量を服用してください。

年齢	成人(15歳以上)	15歳未満
1回量	全量	服用しないこと

※用法・用量を厳守してください。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



4 974961 180445



製造販売元
株式会社タキザワ漢方廠
さいたま市大宮区堀の内町2丁目623-1
お客様相談室☎048-688-7923
受付時間：9時～18時（月～金）

タキザワ漢方

検索

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

☎ 0120-149-931

