

2013年 6月改訂

# 黄 快

第2類医薬品



## 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと  
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐, 食欲不振, 胃部不快感, はげしい腹痛を伴う下痢, 腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
4. 1週間位(便秘に頓服用として用いる場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 【効能・効果】

便秘, 便秘に伴うのぼせ・肩こり

### 【用法・用量】

成人(15才以上) 1回3gを1日1回頓用する。  
15才未満 服用しないこと

### 【成分・分量】 1日量3.0g中

ダイオウ末 1.0g . センキュウ末 2.0g

### 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

内容量 1kg

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元 **北日本製薬株式会社**  
富山県中新川郡上市町若杉55  
問い合わせ先076-472-1011